

Инструкция по применению капель оптив

Латинское название: optiv

Код АТХ: S01XA20

Действующее вещество: комбинация из глицерола и кармеллозы

Производитель (название компании и страна): Аллерган Сейлс, США

Условие отпуска из аптеки: рецепт на приобретение не нужен

Условия хранения: при температурном режиме – до 25 градусов

Срок годности: 2 года.

Глазные капли оптив нужны для глаз, страдающих от сухости.

Показания по применению

Офтальмологическое средство применяется для устранения синдрома «сухого глаза».

Состав препарата

В 1 миллилитре содержится 1.75 мг кармеллозы и 9 мг глицерола. Вспомогательные компоненты – раствор водный для инъекций, стерильный.

Лечебные свойства

Активные действующие компоненты в составе медикамента проявляют защитные и увлажняющие свойства. С помощью данных капель устраняется ощущение сухости, облегчается общее состояние и уходит тяжесть в веках. Подходит для использования при болезнях, сопровождающихся иссушением слезной пленки и снижением выработки слезной жидкости.

Формы выпуска

Медикамент продается во флаконах с капельницей по 10 и 15 мл в объеме. Флакон пластиковый и прозрачный, имеет внутри жидкость без цвета и запаха.

Способ применения и дозы

Нужно капать лекарство в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли за 1 раз. Можно использовать препарат несколько раз в сутки.

При беременности и грудном вскармливании

Нет конкретных данных, указывающих на совместимость приема беременными и кормящими женщинами на сегодняшний день. При исследованиях на животных негативного влияния на их организм не было выявлено, что означает, что лекарство вполне можно использовать при грудном вскармливании и беременности. Более того, средство не всасывается системно, а это делает его полностью безопасным для женщин в положении и кормящих матерей.

Противопоказания и меры предосторожности

Капли оптив нельзя использовать при индивидуальной непереносимости или при наличии гиперчувствительной реакции на любые компоненты медикамента. Не стоит назначать препарат до совершеннолетия, так как нет данных о безопасности использования в детском возрасте.

С осторожностью – беременные и кормящие матери.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Чтобы не перекрыть фармакологический эффект капель другими медикаментами, следует использовать другие капли минут через 10-15 после закапывания оптива, чтобы он не смылся с глаз.

Побочные эффекты

Местные побочные реакции: ощущение сухости или песка в глазах, неприятный дискомфорт во время нанесения средства, покраснение глаза, чесотка, раздражение и «мушки» в глазах, корочки по краю ресниц.

Реже может возникать: фоточувствительность, глазная боль, ощущение постороннего предмета в глазу, усиленное выделение слез из глаз.

Передозировка

Нет данных о передозировке.