Инструкция по применению ретиналамина

Латинское название: retinalamin

Код АТХ: S01XA

Мнн: retinalamin

Действующее вещество: ретиналамин

Производитель (название компании и страна): ООО Герофарм, Россия

Условие отпуска из аптеки: только по рецепту осуществляется продажа

Условия хранения: в темном и прохладном месте, подальше от детей

Срок годности: 3 года.

Ретиналамин – это лекарство, которое подходит для использования при наличии различных заболеваний глаз.

Показания по применению

К ним относятся:

- Глаукома открытоугольного типа
- Воспалительный процесс или травматизация, ожог сетчатки глаз;
- Ретинопатия, вызванная наличием сахарного диабета любого типа
- Близорукость различной степени тяжести
- Центральная и периферическая абиопатия.

У лиц, страдающих от сахарного диабета, может медикамент использоваться при наличии полинейропатии или ретинопатии.

Состав препарата

Активные действующие вещества в составе: 5 мг ретиналамина на водной основе и 17 мг глицина. Вспомогательных компонентов другого происхождения не обнаружено.

Лечебные свойства

Данное средство считается уникальным в своем роде, так как имеет отличительную структуру и происхождение. Медикамент направлен на улучшение состояния сетчатки глаза. Это лиофилизированный порошок, который добывается из глаз крупного рогатого скота. С помощью лекарства можно улучшить трофику и общие обменные процессы, восстановить нарушенную клеточную структуру, улучшить заживление и свертывание белков, повышение местного иммунитета и защита тканей сосудов.

Ретиналамин – это препарат, используемый для стимуляции световых рецепторов, который нормализует работу сетчатки, если имеются явные нарушения в ее функциональной деятельности. С помощью данного медикамента повышается проницаемость сосудов крови, стимулируются восстановительные процессы при наличии

поражение глаза. Под эффектом лекарства улучшается обменный процесс, глаз лучше заживает, если есть болезни или травматизация.

Конкретных данных о системном влиянии на организм не выявлено. Достаточно изучен лишь механизм действия в местном органе-мишени, который заключается в повышении синтеза протеиновых структур и общем разгоне метаболических процессов.

Формы выпуска

Лекарственное средство выглядит как лиофилизированный порошок для разведения белого цвета. Разводить нужно обычной стерильной водой для инъекций. В комплекте идет пять ампул с порошком, которые упаковываются в картонные упаковки.

Способ применения и дозы

При различных ранениях, травмах или повреждениях медикамент вводится по 1-2 флакона в сутки в течение 10 дней. Колоть уколы следует внутримышечно, перед этим развести в воде для инъекций 2 мл. Глаукома и близорукость – по 1 флакону 5 мг в течение полутора недель. Параллельно рекомендуется колоть витамины группы В внутримышечно, для возникновения синергического эффекта, так как данные вещества усиливают друг друга. Рекомендуется купить комплексные препараты цианокобаламина, пиридоксина и тиамина (мильгамма, нейрорубин) и вводить их по инструкции или врачебному назначению. Уколы для детей вводятся в суточной дозировке в 2 раза меньше.

При беременности и грудном вскармливании

Беременным и кормящим матерям не следует назначать эти уколы.

Противопоказания и меры предосторожности

Возраст до года и аллергические реакции – абсолютные противопоказания. Беременные и кормящие – под большим вопросом и с осторожностью.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Нет данных о взаимодействии.

Побочные эффекты

Редко возникают различные аллергические проявления.

Передозировка

Нет данных.