

## Инструкция по применению ангиофлюкса

Латинское название: angioflux

Код АТХ: В01АВ11

Действующее вещество: сулодексид

Производитель (название компании и страна): Митим, Италия

Условие отпуска из аптеки: на приобретение препарата требуется рецепт

Условия хранения: при температурном режиме до 30 градусов тепла

Срок годности: 3 года.

Ангиофлюкс можно использовать при повышенном риске возникновения тромбозов у лиц с повышенной вязкостью крови.

### Показания по применению

К ним относятся:

- Риск возникновения тромбозных сгустков крови
- Ишемическая болезнь отделов нижних конечностей
- Нефропатия и ретинопатия в анамнезе
- Макроангиопатия по причине диабета.

### Состав препарата

1 капсула содержит 250 ЛЕ активного действующего компонента, а раствор для инъекций состоит из 300 ЛЕ на 1 мл.

### Лечебные свойства

Ангиофлюкс относится к антикоагулянтам, обладает фибринолитическими, антикоагулянтными и противотромботическими фармакологическими свойствами. Сулодексид – это концентрированный экстракт слизистой оболочки тонкого кишечника у крупного рогатого скота. В составе вещества находится гепариноподобные элементы и дерматан в сульфатной форме. В конечном итоге после применения возникает подавление факторов свертывания, а также снижается содержание фибриногена, параллельно концентрации плазминогена увеличиваются. Также медикамент способен восстанавливать эндотелиальные клеточные структуры.

Ангиофлюкс понижает показатели вредного холестерина в организме, улучшает реологические свойства крови, в больших дозировках проявляет себя как антикоагулянт. Более выраженное воздействие на организм проявляется при внутривенных уколах. После парентерального введения вещество быстро расходуется по телу, а 90% от введенной дозировки поступает в эндотелий. Пиковая концентрация вещества в крови наблюдается через 10 минут. Средство полностью выводится из организма, без предварительного метаболизирования в печени, через почки за двое суток.

## Формы выпуска

Капсулы и инъекционный раствор по 2 мл в упаковке. Ампул 5 штук в пачке.

## Способ применения и дозы

Длительность терапии и дозировка подбираются индивидуально под пациента. Можно ставить лекарство внутримышечно или внутривенно по 600 единиц, до двух недель включительно. Далее применяются капсулы после двухнедельного срока использования по 250 единиц 2 раза в день, длительность в месяц-полтора. Терапию желательно проводить 2 раза в год и параллельно контролировать показатели сворачиваемости крови.

## При беременности и грудном вскармливании

Ангиофлюкс не назначается беременным и кормящим матерям, так как противопоказан.

## Противопоказания и меры предосторожности

Нельзя назначать ангиофлюкс в таких случаях:

- При выраженной чувствительности и непереносимости к веществу или любому из компонентов в его составе
- При выраженной склонности к геморрагиям
- При беременности и грудном вскармливании
- При сниженных показателях свертываемости крови.

## Перекрестные лекарственные взаимодействия

Нельзя параллельно назначать антиагреганты и прочие разжижающие кровь вещества, так как антикоагулянтный эффект потенцируется, что может спровоцировать появление выраженных геморрагий.

## Побочные эффекты

К ним относятся:

- Болезненные ощущения в желудке
- Боль и ощущение жжения
- Высыпания на коже
- Рвота и тошнота
- Синяки и кровоизлияния в местах уколов.

## Передозировка

Обычно передозировка ангиофлюкса проявляется в виде сильной кровоточивости. Если такое случилось, нужно просто отменить препарат.