Инструкция по применению препарата баларпан н и баларпан

Латинское название: balarpan

Код АТХ: S01XA

Действующее вещество: сульфатированные гликозаминогликаны

Производитель (название компании и страна): Эгрофарм, Россия

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 15 градусов, в холодных условиях без предварительной заморозки и подальше от детей в темном месте

Срок годности: 2 года, а после вскрытия флакона средство используется в течение двух недель.

Глазные капли баларпан назначаются офтальмологами при различных зрительных расстройствах.

Показания по применению

К ним относятся:

- Наличие бельма на глазу
- Кератиты и конъюнктивиты в комбинации в анамнезе
- Кератит язвенного характера
- Ожоги на роговичном слое
- Кератопатия различного генеза
- Проведение кератопластики и многих других хирургических манипуляций подобного характера.

Состав препарата

В 1 мл препарата находится 100 мкг действующего вещества. Вспомогательные компоненты в составе: натрия хлорид и вода для инъекций.

Лечебные свойства

Данное вещество относится к классу восстанавливающих препаратов. Баларпан капли имеют в своем составе гликозоаминогликаны, которые относятся к естественной составляющей, входящей в тканевые структуры роговицы. С помощью капель можно добиться ускорения восстановления поврежденных тканевых структур на роговице и в глазу, в целом. Медикамент помогает заживить эпителий, который был поврежден неблагоприятными факторами химического, травматического, ожогового, лучевого и инфекционного происхождения. Лекарство хорошо запускает репаративные локальные процессы.

Формы выпуска

Капли для глаз баларпан выглядят как прозрачный и бесцветный раствор без запаха и вкуса. Расфасовывается лекарство в несколько вариантов упаковок: стеклянная баночка, прозрачная с крышкой-капельницей, емкостью в 10 мл; 10 мл вещества в пластиковой с капельницей упаковке и 1.5 мл в алюминиевом тюбике с вмонтированной капельницей.

Способ применения и дозы

Баларпан н и обычный баларпан капли глазные не имеют между собой отличия в инструкции по применению. Если есть повреждения роговицы, то нужно капать до 5 раз в день по 2 капли в каждый глаз, в течение семи дней подряд. При наличии синдрома раздраженного глаза, кератитов и конъюнктивитов средство капается по ранее указанной схеме, но длительностью в 4 недели. Если нужно долго носить контактные линзы, то глаз иссушается, а препарат хорошо его увлажнит. Можно закапать по капле в каждый глаз 1 раз в сутки. При различных дегенеративных изменениях нужно капать по 2 раза в день по капле в каждый глаз в течение 4-х недель.

Чем отличается баларпан н от обычного аналога?

В составе двух вариантов нет конкретных отличий, они практически одинаковы лишь за исключением одного момента – простой баларпан не подходит в качестве вспомогательного средства для коррекции зрения, только вариант с пометкой «н».

При беременности и грудном вскармливании

Беременным и кормящим матерям можно использовать средство только под присмотром специалиста, с осторожностью.

Противопоказания и меры предосторожности

Непереносимость или повышенная чувствительность являются абсолютными противопоказаниями, также не стоит использовать медикамент при покраснении конъюнктивы. Не стоит назначать средство несовершеннолетним. Осторожно – беременные и кормящие матери.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Лекарство хорошо сочетается с местными антибиотиками, применяемыми в офтальмологической сфере.

Побочные эффекты

Иногда может развивать повышенная чувствительность к лекарственному средству.

Передозировка

Маловероятна.