

Дистрептаза свечи: инструкция по применению

Латинское название: Distreptaza

Код АТХ: B01AD

Действующее вещество: Стрептокиназа и стрептодорназа

Производитель: Биомед-Люблин, Польша

Условие отпуска из аптеки: По рецепту

Условия хранения: t от 2 до 8 С

Срок годности: 3 года

Дистрептаза относится к ферментным препаратам, которые оказывают антитромботическое действие.

Показания к применению

Назначается препарат при:

- Аднексите (как протекающем в острой стадии, так и при хроническом его течении)
- Признаках эндометрита
- Наличии инфильтрата, который образовался после операции
- Диагностировании воспаления геморроидальных вен
- Сальпингите
- Обнаружении кисты копчика
- Свище
- Развитии парапроктита.

Лекарственное средство может применяться для предотвращения спаечного процесса в послеоперационный период (брюшная полость, малый таз).

Состав

Один суппозиторий содержит два активных компонента, представленных стрептокиназой и стрептодорназой, их массовая доля в лекарстве равна 15000 МЕ и 1250 МЕ соответственно. Также присутствует твердый жир, а также минеральное масло.

Лечебные свойства

Дистрептаза является препаратом с комбинированным составом, его терапевтическое действие обусловлено специфическими свойствами каждого из компонентов.

Стрептокиназа способствует активизации проэнзима плазминогена, который имеется в человеческой крови, под воздействием стрептокиназы наблюдается трансформация в плазмин. Именно это вещество характеризуется особым свойством – растворять кровяные сгустки.

Стрептодорназа – это, в первую очередь, фермент, он способствует растворению скопления нуклеопротеидов, гнойных выделений мертвых клеток, при этом не оказывая воздействия на живые клетки и их функции.

ЛС способствует лучшему проникновению антибактериальных ЛС и химиотерапевтических препаратов к воспалительному очагу.

Форма выпуска

Свечи Дистрептаза светло-бежевого оттенка помещены в ячеечные упаковки, внутри пачки имеется 6 суп.

Дистрептаза: инструкция по применению свечей

Дистрептазу в свечах используют ректально. Рекомендуется вводить суппозитории как можно глубже.

При тяжелой степени патологии:

- Первые 3 дн. – 1 суп. ставится трехкратно за сутки
- С 4 по 6 день – 1 суп. вводится двукратно на протяжении дня
- Последующее применение – по 1 суп. единоразово в день (на протяжении 3 дн.).

При легкой и умеренной степени патологии назначают следующую схему применения:

- Первые 3 дн. – 1 суп. ставится двукратно за сутки
- С 4 по 7 день – 1 суп. вводят 1 р. за сутки или по 1 суп. дважды за день (на протяжении двух дней).

Противопоказания и меры предосторожности

Не рекомендуется применять при наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам.

Не следует использовать свечи при наличии свежих раневых поверхностей и швов после операции. Не назначается детям, беременным и кормящим женщинам.

Противопоказано применение ЛС пациентам с нарушением свертываемости крови.

Не допускается одновременное применение со средствами-антикоагулянтами, с иными лекарственными препаратами, включающими кальций, без осуществления контроля коагулограммы.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

ЛС улучшает абсорбацию антибактериальных препаратов и других химических средств в воспалительный очаг.

Не следует одновременно применять антикоагулянты, так как высок риск открытия кровотечения.

Побочные эффекты

Могут регистрироваться локальные проявления аллергии, выраженная гиперемия, повышается риск открытия кровотечений.

Возможно появление изменений в месте введения свечей: сильное раздражение, отечность слизистых, болезненные ощущения.

Передозировка

Не была зафиксирована.