Алоэ экстракт жидкий для инъекций: инструкция по применению

Латинское название: Aloes extract fluid

Код АТХ: А13А

Действующее вещество: Алоэ экстракт

Производитель: ВИФИТЕХ, Россия

Условие отпуска из аптеки: По рецепту

Условия хранения: t до 25 С

Срок годности: 3 года

Экстракт алоэ жидкий – препарат растительного происхождения, который является дополнительным источником витаминов и ферментов, что способствуют устранению воспалительного процесса и скорейшему восстановлению организма после перенесенных заболеваний.

Показания к применению

Применение препарата показано при:

- Язвенных недугах ЖКТ
- Нарушении пищеварительной функции (запор)
- Признаках гастрита, гастродуоденита
- Комплексном лечении холецистита и энтероколита
- Сильных головных болях
- Приступах бронхиальной астмы
- Диагностировании туберкулеза
- Воспалении легких
- Невралгии
- Различных типах конъюнктивитов
- Кератите
- Блефарите
- Признаках помутнения стекловидного тела
- Возникновение миопатического хориоретинита
- Ирите
- Диагностировании воспалительного процесса в глазных сосудах
- Прогрессировании близорукости
- Атрофии зрительного нерва
- Развитии трахомы
- Пигментном ретините
- Признаках рубцевания тканей
- Наличии трофических изъязвлений
- Комплексном лечении бесплодия (как у женщин, так и мужчин)

- Ухудшении слухового восприятия, нарушении обоняния
- Лучевой болезни
- Утрате интереса к пище.

Состав

Внутри 1 амп. (1 мл) содержится 0,7 мл основного компонента – водного экстракта алоэ, который получен из свежих листьев, выдержанных в темноте при пониженной температуре, или из сухого сырья. Также в растворе имеется физраствор и вода.

Лечебные свойства

Жидкий экстракт алоэ представляет собой биогенный стимулятор, благодаря особым свойствам проявляет адаптогенное, выраженное желчегонное, общетонизирующее и слабительное действие. Он является антисептиком, который способствует регенерации тканей и слизистых.

Благодаря внутримышечному введению наблюдается ускорение регенерации тканей, а также их трофики. Повышается устойчивость слизистых к негативному воздействию различных повреждающих факторов, нормализуется протекание внутриклеточных метаболических процессов. Наряду с ускорением регенеративных процессов в тканях регистрируется усиление неспецифической резистентности организма.

ЛС способствует активизации защитных систем клеток-гранулоцитов, при регулярном инъекционном введении растительного экстракта улучшается аппетит, повышается подвижность мужских половых клеток — сперматозоидов, а также их энергетический потенциал.

Форма выпуска

Стерильный раствор светло-желтого или коричневатого оттенка со слабовыраженным фруктовым ароматом разлит в ампулы объемом 1 мл, внутри пачки имеется 10 амп.

Инструкция по применению жидкого экстракта алоэ

Алоэ экстракт жидкий для инъекций вводят внутримышечно или подкожно.

Перед вскрытием ампулу потребуется встряхнуть, чтобы образовался однородный раствор.

С учетом типа и характера течения заболевания назначается постановка 30-50 уколов. Подкожное введение растительного раствора осуществляется ежедневно в дозах, которые зависят от возрастной категории пациента. Для взрослых назначают 1 мл ЛС за сутки. Стоит учитывать, что максимальная суточная доза составляет 4 мл.

Дозировки для деток:

- От 3 до 5 лет ставят инъекции с применением 0,2-0,3 мл раствора
- От 5 лет показано введение 0,5 мл препарата.

Проведение повторного курса лечения возможно по прошествии 2-3 мес.

При заболеваниях дыхательных путей и при туберкулезе рекомендуется вводить препарат в минимальной дозе -0.2 мл, в последующем дозировку растительного экстракта повышают.

При бронхиальной астме обычно назначают постановку 30 уколов. На протяжении 2 нед. инъекции ставят ежедневно, далее – 1 р. за 2 дн.

Противопоказания и меры предосторожности

Не рекомендуется ставить уколы с экстрактом алоэ при:

- Повышенном АД
- Диагностировании язвенного колита
- Признаках непроходимости кишечника
- Патологиях ССС
- Наличии чрезмерной восприимчивости к растительному компоненту
- Цистите
- Воспалении геморроидальных узлов
- Болезни Крона
- Нарушениях со стороны ЖКТ
- Метроррагии
- Эпигастральных болях неясного генеза
- Беременности, ГВ
- Патологиях печени и почечной системы (включая нефрозонефрит, диффузный гломерулонефрита)
- Желчнокаменной болезни
- Воспалении аппендикса
- Кровохаркании.

Не назначается препарат деткам в возрасте до 3 лет.

Если при постанове уколов пациент ощущает сильную боль, рекомендуется сперва ввести 2%-ный раствор новокаина в объеме 0,5 мл. Не следует вводить более 1 мл раствора, дозировка для деток определяется индивидуально.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

С особой осторожностью назначают одновременное применение:

- Лекарств на основе корня солодки
- Кортикостероидов
- Диуретических ЛС
- Сердечных гликозидов
- Препаратов со слабительным действием
- Различных стимуляторов процесса кроветворения
- Антиаритмических препаратов.

Стоит отметить, что при продолжительном проведении лечения экстрактом алоэ или при одновременном применении диуретических ЛС и кортикостероидов может наблюдаться недостаток калия в организме.

Побочные эффекты

При постановке инъекций часто регистрируются болевые ощущения. У лиц, склонных к аллергическим реакциям, могут наблюдаться:

- Кожная сыпь
- Локальная гиперемия и зуд
- Анафилактический шок (очень редко).

Не исключается изменение температуры тела и повышение АД.

Передозировка

При постановке уколов с использованием повышенных доз препарата могу наблюдаться нарушения со стороны ЖКТ (как и при приеме повышенных доз растительной настойки): приступы тошноты, понос, частые рвотные позывы.