

## Инструкция по применению препарата корвалол-мфф

Латинское название: corvalol

Код АТХ: N05CB02

Действующее вещество: масло мяты перечной (из листьев), фенобарбитал и этилбромизовалерианат

Производитель (название компании и страна): Московская фармацевтическая фабрика, Россия

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата в таблетках и в количестве 15 мг или 25 мг не требуется, а флаконы 50 мг требуют предъявления рецептурного бланка

Условия хранения: комнатная температура до 25 градусов тепла в недоступных местах для детей и животных, без попадания солнечных лучей

Срок годности: 2 года для таблеток, а для раствора перорального – 2.5 года.

Корвалол Мфф – один из разновидностей популярного успокоительного и сердечного препарата, который изготавливает московская фармацевтическая фабрика.

### Показания по применению

Таблетки выпускаются для приема в таких случаях:

- Невроз и повышенная раздражительность
- Спазм коронарных сосудов или ускоренное сердцебиение
- Гипертония
- Вегетососудистая дистония
- Нейрогенная природа спазмов и расстройства кишечника.

Капли используются для терапии:

- Расстройств деятельности нервной системы
- Раздражительности
- Повышенного артериального давления
- Нейроциркулярной дистонии
- Бессонницы
- Ускоренного сердечного ритма
- Спазма коронарных сосудов.

### Состав препарата

Описание: таблетки и раствор имеют те же действующие вещества: комбинацию фенобарбитала, мятного масла и этилбромизовалерианата. Вспомогательные компоненты таблеток: лактозы моногидрат, магния стеарат, ацесульфам, стабилизаторы.

Дополнительно в состав раствора входят: чистая вода, 96% этанол, стабилизатор.

### Лечебные свойства

Данный медикамент обладает спазмолитическими, сосудорасширяющими и успокоительными свойствами. Препарат способствует наступлению нормального физиологического сна благодаря компонентам, входящим в его состав. Успокоительный эффект достигается преимущественно из-за компонента, имеющего сходство с валерианой. Он запускает процессы торможения в головном мозгу, также обладает расширяющими сосуды свойствами. Благодаря чему достигается местный обезболивающий эффект и снижается повышенное давление. Фенобарбитал в общем снижает возбуждение в коре головного мозга, запускает действие тормозных нейромедиаторов, за счет чего достигает транквилизирующий, успокаивающий и седативный эффект, выраженность проявления эффекта напрямую зависит от принятой дозировки.

В целом, данный препарат влияет подавляюще на центры возбуждения в нервной системе, которые влияют на сосудистый тонус и периферические, коронарные сосуды, что помогает их расширить, снизить давление и положительно сказаться на состоянии здоровья сердечной мышцы. Мятное масло снимает спазмы, гоняет желчь и успокаивает нервную систему. После сублингвального приема препарат быстро усваивается, а биодоступность варьируется в пределах 70%. Еще быстрее всасывается медикамент, если принять его на кусочке сахара. Наступает эффект гарантированно примерно через полчаса, в среднем длительность эффекта варьируется в пределах 3-6 часов. У лиц, которые ранее принимали лекарства на основе фенобарбитала, будет снижена чувствительность к корвалолу, так как происходит со временем ускорение выведения данного вещества в печени, так как активизируются печеночные ферменты. Заболевания печени способствуют снижению метаболизма препарата.

#### Формы выпуска

Оральные капли по 15 и 25 мл прозрачные в темных стеклянных флаконах, имеют выраженный запах, который долго сохраняется. Таблетки продаются в блистерах по 10 штук, они маленькие и белые.

#### Способ применения и дозы

Инструкция по применению указывает, что лучше всего пить капли, разводя их в 50 мл воды или на кусочке сахара. Пить нужно за полчаса до приема пищи. Стандартная рекомендация – в пределах 15 – 30 капель за раз. Если больного мучают спазмы коронарных сосудов, то подойдет и 40-50 капель за раз. При бессоннице – 30 капель за полчаса до сна. Таблетки рассасываются сублингвально по 1 штуке за раз, кратностью в день 2-3. Длительность лечения зависит от индивидуальных показаний.

#### При беременности и грудном вскармливании

Можно ли при беременности и лактации пить корвалол? Нет, это запрещено делать. Если женщина забеременела во время курса приема, то лечение необходимо прекратить.

#### Противопоказания и меры предосторожности

Нельзя принимать препарат при непереносимости брома, каплей или таблеток, хронической сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, депрессии и печеночной порфирии. Осторожно принимать при эпилепсии.

#### Перекрестные лекарственные взаимодействия

Потенцирует препарат эффект анальгетиков, анестетиков, других снотворных, седативных средств, алкоголя, вальпроевой кислоты. Зидовудин усиливает токсичность.

#### Побочные эффекты

К ним относятся:

- Головокружение, сонливость, мигрень, галлюцинации, спутанность сознания, слабость
- Тошнота, запор, рвота, аллергии
- Анемия, тромбоцитопения
- Проблемы с дыханием, брадикардия, снижение артериального давления
- Депрессия, насморк, атаксия (при длительном применении).

#### Передозировка

При передозировке возникает абстинентный синдром, головокружение, головная боль, сонливость, спутанность сознания, угнетение нервной системы. При сильной передозировке: нарушение и ускорение сердечного ритма, кома, коллапс, смерть, угнетение дыхания.