

Инструкция по применению препарата мебикар

Латинское название: mebicar

Код АТХ: N05BX

Действующее вещество: тетраметилтетраазабициклооктандион

Производитель (название компании и страна): Татхимфармпрепараты, Россия

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата требуется

Условия хранения: комнатная температура до 30 градусов тепла, подальше от детей в сухих условиях

Срок годности: 4 года.

С помощью мебикара можно убирать эпизодическое тревожное состояние и прочие неврологические расстройства различного происхождения.

Показания к применению

К ним относятся:

- Ишемическое заболевание сердечной мышцы, кардиалгия и период восстановления после случившегося инфаркта миокарда в составе комплексного лечения
- Зависимость от табакокурения
- Различные состояния невротозов, сопровождаемые эмоциональной лабильностью, тревожностью, раздражительностью, страхами, переживаниями, паническими атаками, которые возникают по причине чрезмерного нервного потрясения, сильных физических и эмоциональных нагрузок
- С целью улучшения восприимчивости или переносимости нейролептиков или прочих анксиолитиков
- Невротозы у лиц, страдающих от алкоголизма
- В составе комплексной терапии влечения к алкоголю
- Нарушенный ночной сон, в составе комплексной терапии.

Состав препарата

Таблетки мебикара состоят из 300 мг активного действующего вещества.

Вспомогательные компоненты в качестве наполнителей: крахмал и стеарат кальция.

Лечебные свойства

Мибикар – это лекарство, относящееся одновременно к анксиолитикам и ноотропам. Средство обладает защитными от стресса свойствами, улучшает слегка когнитивные функции и снимает легкое состояние тревожности. Также медикамент улучшает снабжение тканей сердца дополнительно кислородом, благодаря чему улучшается электролитный баланс в плазме, нормализуется количество калия, натрия, красных кровяных телец, усиливается белковый синтез и энергетические клеточные ресурсы.

Средство положительно влияет на сон, но при этом не обладает снотворными свойствами. Не расслабляет мышцы и не проявляет холинолитический эффект, не нарушает двигательную координацию, также снижает зависимость от никотина. Около 80% принятого средства попадает в кровяное русло, и хорошо распространяется по организму. Пиковой концентрации препарат достигает за полчаса, полностью выводится из организма в течение суток.

Формы выпуска

Таблетки белого цвета, круглые, плоские с черточкой посередине. В одной упаковке содержится 10 штук, один блистер.

Способ применения и дозы

Инструкция по применению мебикара указывает, что его нужно принимать внутрь независимо от приема пищи. Обычно суточная дозировка колеблется в пределах 300 – 900 мг до 3 раз в сутки. Максимальная разовая доза не должна превышать 3 грамм, а суточная – 10 грамм. Длительность лечения или профилактического приема может длиться от 2-3 дней до 2-3 месяцев, а при реальных психических расстройствах – до полугода. Если присутствует раздражительность, синдром эмоциональной лабильности, страх или тревога, то надо пить по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Стенокардия, ишемия, хроническая усталость, психические расстройства, нервозность или страхи – по 2-3 таблетки 3 раза в сутки. Для лечения никотиновой или алкогольной зависимости следует принимать препарат по 2-3 таблетки 3 раза в сутки в течение 45 дней. Лицам, страдающим от органических мозговых поражений, проявляемых в виде психических расстройств, или при непереносимости прочих нейролептиков следует пить медикамент по 3-6 таблеток 3 раза в день.

При беременности и грудном вскармливании

Беременным и кормящим матерям не стоит принимать медикамент в данные периоды жизни.

Противопоказания и меры предосторожности

Непереносимость или повышенная чувствительность к действующему веществу препарата.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Средство усиливает эффект наркотических и снотворных препаратов.

Побочные действия

Среди побочных реакций препарата мебикара могут наблюдаться некоторые проявления аллергических признаков, включая покраснения на коже, отеки или крапивницу. В больших дозировках может возникнуть кратковременная гипотония, что полезно для гипертоников, диспепсия или повышение давления. Снижение давления и повышение

показателей температуры не относятся к причинам прекращения терапии, данные побочные эффекты не столь существенны.

Передозировка

Возможно усиление или возникновение побочных реакций при передозировке. В таком случае нужно промыть желудок и провести стандартный протокол действий по дезинтоксикации организма.