Триметин: инструкция по применению порошка

Латинское название: Trimethinum

Код АТХ: N03AC02

Действующее вещество: Триметадион

Производитель: Фармакон ОАО, Россия

Условие отпуска из аптеки: По рецепту

Условия хранения: t до 20 С

Срок годности: 5 лет

Триметин относится к числу противосудорожных средств, используется в психиатрии в качестве вспомогательного средства при лечении эпилепсии.

Показания к применению

Лекарство назначается к применению при:

- Малых эпилептических припадках
- Диагностировании акинетической формы эпилепсии
- Признаках психического возбуждения.

Состав

В 1 г порошкообразной смеси имеется 1 г основного компонента триметадиона.

Лечебные свойства

Лекарственное средство оказывает позитивное влияние на работу ЦНС, проявляя выраженное противосудорожное, а также противоэпилептическое воздействие.

В случае эпилепсии, которая проявляется припадками умеренной силы, препарат способствует снижению частоту их проявления.

Как правило, лекарство применяют одновременно с ЛС, входящими в группу барбитуратов. Терапевтический эффект проявляется спустя 14-21 день.

Активный компонент Триметина довольно быстро абсорбируется с последующим равномерным распределением в тканях.

Метаболические превращения протекают преимущественно в клетках печени. Процесс выведения продуктов обмена осуществляется при участии почечной системой.

Лекарственное средство кумулируется в организме, поэтому не назначается для длительного применения.

Форма выпуска

Мелкодисперсный порошок молочно-белого оттенка расфасован в полиэтиленовые пакеты по 300 г или 500 г.

Инструкция по применению порошка

Лекарство применяется внутрь в дозировке 0,25 г двукратно за сутки. Деткам ЛС назначается по 0,05-0,2 г, кратность применения – 2 р. за сутки, точная доза подбирается с учетом возраста ребенка. Наиболее предпочтительное время приема лекарства – утро и вечер (непосредственно перед сном). Наибольшая единоразовая доза Триметина составляет 0,4 г, а суточная дозировка – 1,2 г.

В случае малых форм эпилепсии длительность курса лечения обычно составляет 5 мес., назначается одновременный прием барбитуратов. После того как будет достигнута стойкая ремиссия рекомендуется постепенное снижение дозировки и в последующем отмена ЛС. Стоит учитывать, что при эпилепсии результат лечения не стойкий, не исключается возникновение рецидивов.

В случае невралгии лечебная терапия продолжается 1-2 мес.

Во время курса терапии необходимо каждую неделю проводить исследование крови даже без видимого ухудшения состояния пациента, чтобы исключить развитие осложнений и при выявлении нарушений своевременно завершить прием лекарства.

На сегодняшний день выпускается препарат с таким же торговым названием, но он имеется совершенно иной состав (сульфаметоксазол + триметоприм), его используют ветеринарные клиники с целью лечения болезней животных при различных бактериальных инфекциях. Стоит отметить, что он довольно эффективен при лечении сальмонеллеза, колибактериоза. Производится в виде порошка и пилюль.

Противопоказания и меры предосторожности

Перед применением стоит ознакомиться со списком противопоказаний.Не назначается лекарство при:

- Недугах системы кроветворения
- Патологиях почечной системы и печени
- Заболеваниях зрительного нерва
- Беременности.

Лечение при ГВ должно проходить с особой осторожностью.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Препарат усиливает тормозящее действие на ЦНС аналогичных по действию лекарств, а также этанола.

Одновременное применение антихолинэстеразных ЛС способствует возникновению миастении.

При использовании ацетазоламида наблюдается усиление токсического влияния на зрительный нерв.

Побочные эффекты

Во время лечения не исключается побочные явления:

- Возникновение светобоязни
- Появление высыпаний на коже
- Развитие нейтропении
- Проявление анемии, моноцитоза
- Появление признаков эозинофилии, агранулоцитоза.

Передозировка

Прием повышенных дозировок провоцирует сильную сонливость, которая со временем может смениться повышенной возбудимостью. Регистрируется нарушение координации движений, головокружение, появление галлюцинаций.