Флюанксол: инструкция по применению таблеток и раствора

Латинское название: Fluanxol

Код АТХ: N05AF01

Действующее вещество: Флупентиксол

Производитель: Х. Лундбек, Дания

Условие отпуска из аптеки: По рецепту

Условия хранения: таблетки - t до 30 С, раствор - t до 25 С

Срок годности: таблетки – 3 года, раствор – 4 года

Флюанксол и Флюанксол Депо – препараты из группы нейролептиков, характеризуются анксиолитической активностью. Благодаря применению Флюанксола удается устранить различные невротические расстройства, избавиться от хронической усталости и признаков депрессии.

Показания к применению

Лечение данным лекарственным средством назначается при:

- Диагностировании депрессивных состояний легкой или средней степени тяжести Различных невротических нарушениях, при которых наблюдаются выраженные симптомы угнетения деятельности ЦНС, а также чрезмерная тревожность
- Признаках психосоматических нарушений с проявлением астении
- Проявлении острых тревожных расстройств
- Чрезмерном эмоциональном напряжении
- Психозах в сочетании с апатией, признаках аутизма
- Развитии депрессивного синдрома
- Постановке диагноза – шизофрения.

Состав

Флюанксол таблетки содержат один активный компонент, который представлен флупентиксолом, его количество в 1 таб. составляет 0,5 мг; 1 мг и 5 мг. Согласно описанию присутствуют и вспомогательные компоненты:

- Лактоза в виде моногидрата
- Тальк
- Стеариновокислый Mg
- Окись Fe
- Сахароза
- Крахмал
- Желирующий компонент
- Capol 1295.

Флюанксол Депо (лекарство для постановки инъекции) включает 20 мг и 100 мг активного вещества – флупентиксола деканоат. В уколах также содержатся среднецепочечные триглицериды.

Лечебные свойства

Активное вещество, содержащиеся в пилюлях и растворе, относится к числу нейролептиков (является производным такого вещества как тиоксантен), проявляет выраженное антипсихотическое действие. ЛС характеризуется анксиолитической активностью. Механизм действия лекарства основан на блокировке рецепторов таких веществ как дофамин и серотонин.

Во время использования препарата регистрируется редукция симптомов психозов, устраняются галлюцинации, купируются расстройства процессов мышления. Проявление антипсихотическое действие удается достигнуть за счет применения ЛС в дозе, не превышающей 3 мг за день. Терапевтический эффект имеет дозозависимый характер.

Флюанксол оказывает антиаутистическое влияние. Активное вещество таблеток и раствора проявляет специфическое влияние, что позволяет устранить частые смены настроения при депрессии, а также облегчить процесс адаптации в социуме. Проявление седативного эффекта наблюдается при приеме повышенных доз ЛС. Применение инъекционного раствора обеспечивает проявление длительного лечебного действия, снижается вероятность возникновения рецидивов у лиц с низким комплаенсом.

Наивысшие плазменные концентрации наблюдаются по прошествии 3-6 часов с момента приема пилюль. Показатель биодоступности регистрируется на уровне 40%.

Активное вещество ампул после постановки инъекции подвергается ферментативному расщеплению, в результате формируется цис(Z)-флупентиксола вместе с декановой кислотой. Наивысшие плазменные концентрации цис(Z)-флупентиксола регистрируются спустя 7 часов после введения лекарства. Наблюдается высокая степень связи с плазменными белками (практически 99%).

Продукты метаболических превращений не проявляют нейролептическую активность.

Длительность периода полувыведения при приеме пилюль составляет не более 35 часов, при постановке инъекций – до 3 нед.

Выведение продуктов обмена осуществляется в большей мере с калом, незначительной количество – с мочой.

Форма выпуска

Таблетки дозировкой 0,5 мг и 1 мг круглые, коричневато-желтого оттенка, размещены в пластиковом контейнере (50 шт. или 100 шт.).

Пилюли дозировкой 5 мг имеют овальную форму, коричневато-желтого оттенка, помещены в пластиковый контейнер (100 шт.).

Раствор представлен прозрачной с желтоватым оттенком жидкостью, разлит в ампулы по 1 мл. Внутри пачки имеется 10 амп.

Флюанксол: полная инструкция по применению

В случае лечения депрессивных состояний, повышенной тревожности рекомендуется пить по 1 мг на протяжении дня (единоразово или же за 2 приема). При недостаточно выраженном терапевтическом действии возможно повышение стандартной суточной дозы до 2 мг. Стоит отметить, что наивысшая суточная дозировка составляет 3 мг. Если при приеме максимальных доз ЛС не наблюдается ожидаемый лечебный эффект, лечение следует отменить.

При психозах обычно рекомендуется принимать дозировку таблеток 3-15 мг за сутки. Назначенную врачом суточную дозу следует разделить на 2 или же 3 применения. Наивысшая дозировка препарата при данной патологи составляет 40 мг. При поддерживающем лечении рекомендуется пить 5-20 мг на протяжении дня. Предпочтительнее всего осуществлять прием поддерживающей дозы утром.

Раствор предназначен для в/м введения в ягодичную область, вводить лекарство в другие мышцы не рекомендуется. Введение иглы осуществляется не сильно глубоко в ткани для последующего формирования депо ЛС. Временной промежуток между инъекционным введением лекарства определяется индивидуально. Стоит отметить, что стандартный интервал составляет 3 нед., назначают применение препарата в форме раствора в дозе 20-40 мг. При остром течении патологического процесса может использоваться до 400 мг ЛС за сутки. После купирования наблюдаемой симптоматики следует перейти на поддерживающее лечение – назначается вводить 20-200 мг препарата за сутки на протяжении последующих 2-4 нед.

При переходе на парентеральные формы ЛС необходимо обязательно учитывать потребность в повышении дозы лекарства в 4 р. Рекомендовано дополнительно использовать таблетированную форму препарата в низких дозах еще 7 дн. после начала в/м введения Флюанксола. Кратность постановки инъекций и необходимая доза ЛС назначается индивидуально врачом с учетом общего состояния пациента и наблюдаемой эффективности проводимого лечения.

Противопоказания и меры предосторожности

Применение лекарства Флюанксол противопоказано при:

- Выраженном угнетении работы ЦНС и костномозговых функций
- Пребывании пациента в коме
- Синдроме алкогольной абстиненции
- Отравлении опиатами, а также барбитуратами
- Нарушениях со стороны системы кроветворения
- Проявлении коллаптоидных состояний
- Беременности, ГВ
- Наличии повышенной чувствительности к компонентам, а также производным тиоксантена

- Признаках феохромоцитомы.

С особой осторожностью потребуется осуществлять применение препарата Флюанксол при:

- Язвенных недугах ЖКТ
- Задержке мочеиспускания
- Развитии глаукомы
- Недугах ССС
- Признаках эмфиземы легких
- Диспноэ, спровоцированного ОРВИ
- Гиперплазии тканей простаты
- Бронхиальной астме
- Возникновении судорожного синдрома
- Патологиях печени
- Болезни Паркинсона
- Алкогольной зависимости (алкоголь может усиливать тормозящее воздействие на НС).

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Прием препарата может спровоцировать усиление седативного воздействия средств на основе барбитуратов и иных ЛС, угнетающих деятельность ЦНС.

Не следует осуществлять применение раствора и таблеток вместе с приемом Гуанетидина и иных препаратов с таким же действием, так как может наблюдаться снижение гипотензивного эффекта Флюанксола.

При одновременном применении трициклических антидепрессантов регистрируется торможение метаболизма каждого из лекарств.

При использовании с препаратами на основе Li повышается нейротоксичность.

Во время приема Леводопы и адренергических ЛС может снижаться их терапевтическое действие.

При комбинированном приеме Метоклопрамида, а также Пиперазина повышается вероятность развития экстрапирамидных расстройств.

Флупентиксол не назначают с лекарствами, которые оказывают схожее действие, так как может изменяться QT-интервал.

При использовании средств, которые провоцируют нарушение электролитного баланса и препаратов, что повышают плазменный уровень флупентиксола, может наблюдаться удлинение QT-интервала и возникновение аритмии.

Инъекционный раствор нельзя вводить одновременно с депонированными формами лекарств (включая кунжутное масло), так как может наблюдаться воздействие на фармакокинетику каждого из препаратов.

Побочные эффекты

Во время лечения возможны побочные реакции, пациент может отмечать:

- Снижение АД
- Повышение аппетита
- Развитие астении
- Пересушенность слизистых ротовой полости
- Торможение психомоторного развития
- Галакторея или же гинекомастия
- Снижение полового влечения (нарушение со стороны органов мочеполовой системы наблюдаются редко)
- Высыпания на коже, дерматит
- Частые приливы
- Развитие ортостатической гипотензией
- Запор
- Признаки дисменореи
- Приступы тахикардии
- Импотенция
- Возникновение холестатической желтухи
- Задержка мочи
- Развитие патологического нейролептического синдрома
- Гипергидроз
- Изменение массы тела
- Дискинезия
- Проявление дистонических реакций
- Нарушение аккомодации
- Признаки гранлоцитопении
- Акатизия
- Изменение активности печеночных ферментов
- Фотосенсибилизация
- Сильное головокружение.

Передозировка

При превышении стандартных дозировок ЛС может наблюдаться:

- Сильная сонливость
- Изменение температуры тела
- Развитие экстрапирамидных нарушений
- Появление судорог
- Снижение АД
- Возникновение коллаптоидных состояний
- Впадение в кому.

Показано проведение промывания ЖКТ, в дальнейшем необходимо принимать средства-энтеросорбенты. Рекомендована посимптомная терапия. В случае судорожного синдрома назначается применение диазепама. Для купирования экстрапирамидных симптомов следует принимать бипериден.