

Инструкция по применению препарата пантогам актив

Латинское название: pantogam active

Код АТХ: N05BX

Действующее вещество: D, L- гопантенвая кислота

Производитель (название компании и страна): Пик Фарма ПРО ООО, Россия

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется

Условия хранения: можно хранить в комнатных условиях до 25 градусов тепла

Срок годности: 3 года.

Использование пантогама актив показано при наличии различных мозговых нарушений.

Показания по применению

К ним относятся:

- Эпилептические припадки с одновременной терапией противосудорожными лекарствами, различные формы эпилепсии также подходят под категорию показаний
- Расстройства мочеиспускания психосоматического характера, которые проявляются в качестве ночного недержания или непроизвольного выделения мочи
- Цереброваскулярный синдром (ЦВБ) из-за наличия атеросклеротических бляшек
- В составе комплексной терапии шизофрении
- Различные нарушения в деятельности мозга при наличии невротических расстройств
- Ранее пережитые органические состояния, по типу инсульта, гипоксии
- Болезнь Вильсона, Паркинсон и прочие повреждения экстрапирамидального типа
- Психическая усталость
- Снижение функций нервной системы, которые заключаются в проблемах с памятью, нарушениях речи
- Хроническое состояние стресса.

Состав препарата

1 капсула состоит из 200 мг или 300 мг активного действующего вещества.

Дополнительно внутри оболочки находится магний и целлюлоза в качестве разбавляющих компонентов. Оболочка капсул состоит из желатина, чистой воды, титана диоксида, глицерола, лаурилсульфата натрия.

Лечебные свойства

Пантогам актив относится к группе ноотропных средств, в структуру которого входит гамма-аминомасляная кислота – естественный тормозной нейромедиатор в головном мозге человека. Благодаря модифицированной формуле средства, оно лучше связывается с рецепторами гамма-аминомасляной кислоты и проявляет сильнее свои

фармакологические ноотропные и противосудорожные эффекты, в сравнении с обычной гопантеновой кислотой. Также стоит отметить, что гопантеновая кислота является мощным антагонистом витамина B5, поэтому ее запрещено принимать при гиповитаминозе. Лекарство хорошо помогает увеличить устойчивость головного мозга к кислородной недостаточности, помогает организму лучше бороться с токсическими веществами, увеличивает переносимость физических нагрузок при астении. Вообще, физическую и умственную нагрузку становится проще перенести, по этой причине активность и мозговая деятельность увеличивается. Препарат оказывает одновременно успокоительные и стимулирующие свойства, нормализует поведение, стабилизирует эмоциональный фон, убирает тревожность и слабость, снижает частоту нейрогенных позывов в туалет. После приема внутрь, вещество быстро усваивается в желудочно-кишечном тракте, хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер. Примерно 70% вещества выводится в том же виде через почки, а 30% - вместе с каловыми массами.

Формы выпуска

Форма выпуска – капсулированная, таблетки не выпускаются. Продаются в баночках или картонках в количестве 30, 50 или 60 штук.

Способ применения и дозы

Пантогам актив инструкция по применению указывает, что медикамент применяется исключительно перорально. Капсулы надо пить через 15 – 20 минут после употребления еды, 2 или 3 раза в день. Желательно принимать лекарство сутра или днем. Если форма выпуска 200 мг, то назначается от 1 до 4-х штук за сутки. Если дозировка по 300 мг, то до 3-х штук. Не следует превышать максимальную рекомендуемую суточную дозировку в 2400 мг. Длительность лечения составляет от 1 до 4-х месяцев, реже до одного года. Через 3 – 6 месяцев курс терапии можно повторить. Пантогам актив для детей нельзя назначать, по этой причине нужно искать замену.

При беременности и грудном вскармливании

Беременность (1 триместр) и период грудного вскармливания – полные противопоказания для назначения лекарственного средства. Во втором и третьем триместрах можно принимать лекарство только после консультации со специалистом.

Противопоказания и меры предосторожности

К ним относятся:

- Непереносимость или повышенная чувствительность по отношению к гопантеновой кислоте, а также прочим компонентам в составе капсул
- Острый или хронический воспалительный процесс в почках
- Грудное вскармливание или первый триместр беременности
- Несовершеннолетний возраст.

Осторожно – 2 и 3 триместры беременности.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Медикамент потенцирует эффективность противосудорожных средств местных анестетиков (по типу прокаина). Удлиняет эффекты барбитуратов. Средство снижает побочные действия со стороны карбамазепина, нейролептиков и фенobarбитала. Этидроновая кислота и глицин потенцируют активность медикамента.

Побочные эффекты

Побочные реакции пантогам актив 300 обычно вызывает в сфере иммунитета, которые заключаются в кожной аллергической сыпи, насморка и воспаления верхнего века. Если подобная симптоматика начинает появляться, тогда стоит снизить дозировку или полностью прервать лечение медикаментом. Реже возникают временные негативные симптомы в виде шума в голове, проблемах со сном или чрезмерной сонливостью.

Передозировка

Обычно при передозировке побочные эффекты выражено увеличиваются. В таком случае нужно промыть желудок, принять сорбенты, а также провести симптоматическое лечение.