

Инструкция по применению препарата цитрагин

Латинское название: citrarginine

Код АТХ: А05В

Действующее вещество: цитрат аргинина в комбинации с бетаином

Производитель (название компании и страна): Лафаль Индастри, Франция

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка

Условия хранения: в прохладных и темных местах, подальше от детей

Срок годности: 5 лет.

Цитрагин используется для коррекции здоровья, связанного с нарушением печеночной функциональности.

Показания по применению

Средство назначается при наличии различных печеночных дисфункций, требующих коррекции со стороны фармакологических средств. Любые болезни печени являются показанием к применению цитрагинина.

Состав препарата

Медикамент состоит из таких активных рабочих компонентов: бетаин в соединении с аргинином (аминокислота в цитратной форме). Вспомогательные составляющие: вода стерильная, пищевые натуральные ароматизаторы, спирт этиловый, сахар, кислота лимонная и сахароза, а также прочие соединения.

Лечебные свойства

У лекарства обнаружены выраженные гепатопротекторные фармакологические свойства, так как состоит оно из важных аминокислот, запускающих репаративные процессы в печени. Аргинин участвует в синтезе протеиновых структур, также помогает связывать внутренний аммиак, что запускает процесс детоксикации в организме, вследствие чего вредная структура преобразуется в мочевины, а затем вещество выводится почками. Аргинин потенцирует возникновение положительного азотистого баланса, вследствие чего образуется оксид азота, который обладает противовоспалительными свойствами. Бетаин помогает синтезировать фосфолипиды, которые находятся в клетках печени, а они являются основным защитным звеном гепатоцитов. В целом средство оказывает мембраностабилизирующие свойства, снижает ацидоз и замедляет прогрессию жировой дистрофии печени.

Формы выпуска

Лекарственная форма выпуска – питьевой раствор пероральный в ампулах. Сами ампулы прозрачные, а внутри содержится темная жидкость с красноватым оттенком.

Способ применения и дозы

Инструкция по применению цитрагинина указывает, что ампулы разбавляются в 100 мл воды, после чего их можно пить. Принимать в день можно не более трех штук. Длительность лечения зависит от конкретного диагноза и состояния пациента. Примерные сроки – от двух недель до полугода.

При беременности и грудном вскармливании

Беременность и лактация – периоды, когда нельзя использовать средство.

Противопоказания и меры предосторожности

Средство нельзя использовать в таких случаях:

- Почечная недостаточность выраженного характера
- Повышенная чувствительность организма к лекарству
- Кормление грудью и вынашивание плода
- Детский возраст.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Медикамент нельзя одновременно принимать с антибиотиками, в особенности из группы цефалоспоринов, дисульфирамом, гризеофульвином, кетоконазолом, хлорамфениколом, прокарбазином. Также средство не используется с другими препаратами, которые имеют спиртовую основу.

Побочные эффекты

Нередко возникают побочные эффекты в виде аллергических высыпаний, рвоты или тошноты.

Передозировка

Нет данных о передозировке.