

Виагра для женщин: инструкция по применению

Латинское название: Female Viagra

Код АТХ: G04BE03

Действующее вещество: Силденафил

Производитель: Пфайзер, США

Условие отпуска из аптеки: По рецепту

Условия хранения: t до 30 С

Срок годности: 5 лет

Виагра для женщин – средство, которое предназначено для повышения полового влечения. При приеме пилюль удастся повысить чувствительность эрогенных зон, получить заряд сексуальной энергии.

Показания к применению

Обычно врачи рекомендуют применение препарата в случае фригидности. При регулярном приеме пилюль удастся существенно повысить чувствительность половых органов, активизировать сексуальную активность и улучшить качество половой жизни, получать удовольствие от интимных отношений.

Использовать ЛС могут женщины разного возраста, как после родов, так и в климактерический период. Применение Виагры рекомендовано в случае постоянной сухости во влагалище, что мешает получать удовольствие при половом акте.

Стоит отметить, что препарат используется в случае комплексного лечения бесплодия, так как входящие в состав пилюль вещества помогают нормализовать гормональный фон.

Основанием для приема таблеток является:

- Болезненные ощущения во влагалище при интимном контакте, которые спровоцированы недостаточным сексуальным возбуждением и выраженной сухостью слизистых
- Снижение полового влечения в период менопаузы
- Снижение чувствительности после операции по удалению внутренних половых органов (матки или яичников).

Состав

Лекарство (таблетки) содержат один активный компонент – силденафила цитрат, его доза в 1 пилюле составляет 50 мг или 10 мг.

Наряду с главным действующим компонентом в состав входят:

- МКЦ

- Триацетин
- Стеариновокислый Mg
- Са гидрофосфат обезвоженный
- На кроскармеллоза
- Молочный сахар
- Тi двуокись
- Гипромеллоза
- Индиго кармин алюминиевый лак.

Лечебные свойства

Женская Виагра относится к числу высокоэффективных средств для повышения полового влечения. У многих представительниц прекрасного пола могут наблюдаться проблемы в интимной сфере: недостаточное половое возбуждение, сухость во влагалище, неспособности получать сексуальное удовлетворение. Причинами таких проявлений являются различные факторы, такие как нарушение гормонального фона, так и стрессы, постоянное переутомление.

Как действует Виагра на женщин

Силденафил, содержащийся в пилюлях, способствует усилению кровотока в органах малого таза, за счет этого наблюдается повышение микроциркуляции в малых половых губах и клиторе, нормализуется выделение смазки во влагалище. Благодаря этому даже во время менопаузы можно получать удовольствие от интимных контактов, ощущая оргазмы за счет повышения чувствительности внешних половых органов. При этом устраняется болезненность и сухость во время полового акта.

В результате проведения исследований, в которых участвовали женщины старше 40 лет после удаления матки или яичников, было установлено, что около 90% участниц заметили заметное улучшение в сексуальной жизни после применения стимулятора возбуждения, наблюдался повышенный тонус влагалищных мышц. Примерно 50% женщин, участвующих в эксперименте, отметили повышение чувствительности клитора, появление оргазмов и повышение интенсивности сексуальных ощущений.

Основой препарата являются вещества природного происхождения, которые способствуют повышению интимной активности, а также оказывают благоприятное воздействие на организм:

- Активизируют работу иммунной системы
- Нормализуют кровообращение и работу кровеносной системы
- Стимулируют метаболизм.

После приема пилюли у женщин регистрируется учащение ЧСС, ускорение дыхания, появляется сильное половое желание, повышается производство гормона эстрогена, улучшается секреция во влагалище.

Кроме нормализации кровообращения препарат оказывает действие на НС:

- Способствует устранению депрессивных проявлений
- Помогает расслабиться и сосредоточиться на интимной близости.

Форма выпуска

Средство-стимулятор полового возбуждения представлено таблетками розового цвета, которые упакованы в блистер по 4 таб. Внутри пачки имеется 1 блист.

Также выпускается дженерик женская Виагра в форме капель. Стоит отметить, что Виагра в каплях включает растительные компоненты, ее действие на организм может отличаться от стимулятора возбуждения в таблетированной форме.

Женская Виагра: полная инструкция по применению

Женская Виагра принимается примерно за 30 мин. до предполагаемой интимной близости, препарат нужно запивать водой. Действие ЛС проявляется последующие 5 часов. Виагра – возбудитель для женщин, который должен приниматься в определенной дозе. Изначально стоит осуществлять прием минимальной дозы ЛС – 50 мг. После того как женская Виагра начала действовать можно оценить ее эффективность и при необходимости повысить дозировку.

Стоит учитывать, что минимальная доза составляет 25 мг, а максимальная не должна превышать 100 мг. Виагра – возбудитель полового желания, ее нельзя принимать чаще 1 р. за сутки.

Женщинам в возрасте 65 лет с патологиями почек или печени медикамент под названием Виагра стоит принимать в минимальной дозировке, а именно 25 мг.

Необходимо отметить, что Виагра для мужчин и женщин начинает действовать только при достаточной интимной стимуляции.

Жидкая Виагра в форме капель также показана к употреблению с целью повышения полового влечения, но ее действие более мягкое. Согласно описанию она начинает действовать спустя 10-20 мин. Стоит помнить, что жидкая Виагра должна применяться только после консультации с врачом, несмотря на то, что в ее состав входят растительные компоненты.

Противопоказания и меры предосторожности

Не рекомендуется принимать препарат для повышения либидо при:

- Непереносимости компонентов
- Беременности, ГВ
- Диагностировании стенокардии
- Высокой вероятности открытия кровотечения
- Перенесенном ранее инфаркте или инсульте
- Повышенной нервной возбудимости
- Бессоннице
- Развитии пигментного ринита

- Патологиях почек.

Необходимо проконсультироваться с врачом о возможности применения при миоме матки, так как прием ЛС может оказать негативное воздействие на организм. Специалист должен оценить общее здоровье женщины и возможные негативные действия Виагры.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Не следует сочетать прием препарата с донаторами окиси N, а также органическим нитратами, это связано с тем, что во время их применения наблюдается усиление гипотензивного воздействия самих нитратов.

Противопоказано применение Виагры совместно с такими лекарствами как Итроканазол, Эритромицин, Кетоконазол, а также Циметидин.

При приеме Ритонавира или же Саквинавира потребуется снизить дозировку препарата на основе силденафила до 25 мг.

Не рекомендуется совмещать прием препарата с употреблением алкоголя.

Побочные эффекты

После применения ЛС не исключено развитие побочных явлений:

- Проявление негативных реакций на кожном покрове
- Возникновение головокружения и головных болей
- Развитие светочувствительности
- Нарушение зрительного восприятия
- Ухудшение функционирования ЖКТ.

Передозировка

При приеме сверхдоз может наблюдаться усиление побочной симптоматики. С целью предупреждения передозировки стоит придерживаться инструкции и принимать стандартные дозы ЛС.