

Сиалис 60 мг

Латинское название: Cialis, распространенное наименование в Индии - Tadarise-60

Код АТХ: G04BE08

Действующее вещество: активный компонент Тадалафил

Производитель: Sunrise Remedies, Индия

Условие отпуска из аптеки: по рецепту

Условия хранения: в оригинальной упаковке с соблюдением температурного режима до 30 градусов

Срок годности: 3 года

Таблетки Сиалиса 60 мг – средство для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции у мужчин. Это дженерик, укоряющий эрекцию, продлевающий время сексуального контакта, который предотвращает преждевременную эякуляцию.

Показания к применению и состав препарата

Препарат используется преимущественно для лечения эректильной проблемы. Вот перечень задач, которые он решает.

- Нарушение функции эрекции (импотенция) разной степени и генеза в связи с влиянием физических, психических, возрастных причин.
- Преждевременное семяизвержение (короткая продолжительность полового акта).
- Профилактика эректильной дисфункции.

Главное вещество Сиалис 60 миллиграмм – Тадалафил 60. Повышенная дозировка компонента в тройном размере обеспечивает его активное воздействие на эрекцию мужчины, которая длится до 2-х суток. Высокая продолжительность влияния препарата позволяет принимать его заблаговременно до полового акта. Количество вспомогательных веществ незначительно. Они представлены лактозой, целлюлозой, магния стеаратом и т. д.

Лечебные свойства

Препарат популярен в связи со своими лечебными свойствами, ведь он совершенствует эректильную функцию.

1. За счет высокой эффективности средства оно может работать вне зависимости от степени проблем с потенцией и причины их появления.
2. Продолжительность действия составляет до 36 часов.

Активное вещество Тадалафил в процессе сексуального возбуждения приводит к выделению оксида азота. Это позволяет мышцам пениса расслабляться и увеличивать ток крови в этой зоне. Такие химические реакции влекут за собой быстрое и продолжительное половое возбуждение. В итоге препарат Сиалис 60 мг оказывает несколько воздействий.

- Ускоряет процесс сексуального возбуждения.
- Продлевает половой акт.
- Влияет на форму эрегированного полового органа.

Выход из организма происходит посредством кишечника и почек (естественным образом с фекалиями и уриной). Период полураспада составляет 17 часов. Средство не задерживается в организме и не вредит состоянию внутренних органов.

Формы выпуска и способ применения

Форма производства – таблетки желтого оттенка. Они вложены в специальные блистеры, рассчитанные на 10 штук. Обладают продолговатой формой (каплевидной). На одной из сторон присутствует гравировка. В продаже предлагаются таблетки по 10, 20, 30, 50, 100 штук.

Инструкция по применению Сиалиса проста. Действие препарата Сиалис 60 не зависит от приема пищи и времени дня. Рекомендованная разовая дозировка – 20 мг. Поэтому за раз допустимо принимать лишь 1/3 таблетки. В сутки максимальное количество активного вещества – 60 мг. Принимать препарат нужно после консультации с врачом не позже чем за полчаса до ожидаемого полового акта для более эффективного действия Сиалис.

Противопоказания и меры предосторожности

Средство запрещено к использованию при наличии следующих состояний.

- Проблемы с функционированием сердечной мышцы (аритмия, недостаточность, повреждение клапанов и т. д.).
- Заболевания почек (недостаточность, уретрит, камни) и мочевыводящих путей.
- Проблемы с печенью.
- Деформация пениса врожденного характера.
- Индивидуальная непереносимость компонентов лекарственного состава.
- Отсутствие достижения 18-летнего возраста.

Перекрестные лекарственные взаимодействия, побочные эффекты и передозировка

Данных о взаимодействии препарата с другими лекарствами не имеется. Рекомендуется на время действия Сиалиса воздержаться от других сильнодействующих препаратов. При наличии фоновых хронических заболеваний, требующих медикаментозного лечения, следует проконсультироваться с врачом. Побочные действия от приема препарата заключаются в следующих реакциях.

- Ускорение сердцебиения.
- Боли в области головы в течение нескольких последующих часов после приема.
- Головокружение.

Для устранения этих реакций медикаментозное лечение не требуется, т. к. они проходят самостоятельно. При передозировке возможна головная боль, головокружение, утрата аппетита, заторможенность сознания.