

Спрей Стрепсилс с Лидокаином

Латинское название: Strepils Plus

Код АТХ: R02AA20

Активные вещества: лидокаин, дихлорбензиловый спирт, амилметакрезол

Производитель: Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл, Великобритания

Условие отпуска из аптеки: без рецепта

Условия хранения: в затемненном, не влажном месте

Срок годности: три года

Спрей Стрепсилс с Лидокаином – уникальное средство, оказывающее сразу несколько лечебных эффектов. Преимущество аэрозоля в том, что он не только обладает противомикробной активностью, но и отличается местным анальгезирующим действием. Это позволяет устранить причину развития заболевания и ликвидировать все болезненные симптомы.

Состав и форма выпуска

Стрепсилс плюс производится в форме спрея. Эффективность препарата обусловлена содержанием в нем трех действующих веществ. Первый активный компонент лекарства – амилметакрезол, второй – лидокаин, третий – 2,4-дихлорбензиловый спирт.

Дополнительный состав препарата:

- Раствор сорбита
- Соляная кислота
- Спирт (96%)
- Масляный экстракт мяты
- Ортосульфобензими́д
- Каустическая сода
- Вода
- Масло анисовых семян
- Е 330
- Глицерин
- Е 122
- Левоментол.

Стрепсилс спрей с Лидокаином описание – инструкция гласит, что в светлом флаконе содержится раствор красного цвета. В стеклянной бутылочке находится 20 мл лечебной жидкости.

Флакон закрыт светлой крышкой из пластика с распылительным приспособлением, на которое сверху надет колпачок. Спрей помещен в пачку из картона.

Фармакологические свойства

Стрепсилс – многокомпонентное средство, предназначенное для местного использования. Лекарство оказывает анальгезирующий, противомикробный, противогрибковый и анестезирующий (локальный) эффект.

2,4-дихлорбензиловый спирт останавливает рост бактерий и уничтожает их. Под воздействием этого вещества обезвоживаются клетки патогенов, и они погибают.

Амилметакрезол – производное фенола. Вещество попадает в клетки микробов и подавляет в них выработку белка. Это приводит к разрушению клеточной оболочки и последующей гибели микроорганизмов.

Аэрозоль Стрепсилс Плюс способен уничтожить множество болезнетворных микроорганизмов:

1. Клебсиелла
2. Стафилококки
3. Кандида
4. Диплококки
5. Протозойные и аэробные инфекции.

Помимо антибактериальных составляющих, Стрепсилс содержит Лидокаин, обладающий локальным обезболивающим эффектом.

Лидокаин ингибирует проводимость нервного импульса посредством понижения поляризации нервных клеток. В результате происходит блокировка нейронов и рецепторов восприятия температуры, что купирует боль и снижает чувствительность кожи.

Эфирные масла повышают антисептический эффект Стрепсилса. Кроме того, они активизируют местную циркуляцию крови, снимают отек, воспаление и оказывают смягчающее действие. А сочетание мятного и анисового масел устраняют заложенность носа.

Основные компоненты аэрозоля Стрепсилс почти не абсорбируются в большой кровоток. Ввиду этого аэрозоль не оказывает значительного влияния на организм.

Показания и противопоказания к применению

Стрепсилс с Лидокаином назначают в качестве симптоматического средства для купирования болезненных ощущений в горле и терапии заболеваний ротоглотки. Спрей применяют для лечения ангины, фарингита и тонзиллита.

Аэрозоль устраняет охриплость, снимает воспаление во рту. Лекарство эффективно при стоматологических заболеваниях и кандидоза. Еще спрей применяют в качестве анальгетика и антисептика после хирургического лечения ротоглотки, включая тонзиллэктомию.

Основные противопоказания к применению Стрепсилса с Лидокаином – возраст до 12 лет, непереносимость составляющих препарата. Еще использование спрея не желательно при

бронхоспазме и астме. Лекарство не используют при десквамативном глоссите, больших ранах и эрозиях в горле или полости рта.

Инструкция по применению

Стрепсилс спрей применяют местно после еды или за 30 минут до еды. Использование Стрепсилс плюс возможно с 12 лет. Инструкция по применению таблеток гласит, что раз в 2-3 часа надо рассасывать по таблетке.

Аэрозоль применяют каждые 120 минут, распыляя по 1 дозе (2 нажатия). Спрей можно использовать не больше 6 раз в день. Допустимое количество таблеток в сутки – 8 штук.

Время терапии – до 5 суток. При необходимости врач может изменить дозировку и продолжительность лечения.

При беременности и лактации применение Стрепсилса с Лидокаином не запрещено, так как медикамент не оказывает отрицательного действия на плод. Но лечение должно тщательно контролироваться врачом.

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие
Стрепсилс с Лидокаином обычно нормально переносится. Но иногда препарат способствует развитию аллергии, которая проявляется анафилаксией, гиперчувствительностью, жжением, сыпью, отеком ротоглотки. Также возможно появление крапивной лихорадки и ангионевротического синдрома.

Остальные побочные действия – онемение языка, отсутствие вкусовой чувствительности, ухудшение обоняния. Регулярное использование аэрозоля в больших дозах может спровоцировать расстройства в работе нервной (дистевзия) и пищеварительной (стоматит, изжога, тошнота, диспепсия) систем.

Передозировка проявляется следующими симптомами:

1. Абсолютная потеря чувствительности в дыхательных органах и ЖКТ
2. Рвота
3. Изменения вкуса
4. Тошнота
5. Нарушение работы сердца и сосудов
6. Дисфункция нервной системы.

При возникновении этих признаков необходимо отменить использование спрея и провести симптоматическую терапию.

При сильной передозировке Лидокаином может развиваться Метгемоглобинемия. Для этого состояния характерно головокружение, учащенное сердцебиение, недомогание, акроцианоз, одышка, головная боль, гипоксия. Лечение заключается во внутривенном введении 1-4 мг раствора метиленовой синего.

Стрепсилс плюс не взаимодействует с большей частью лекарственных средств. Но препарат не желательно сочетать с другими антисептическими, противобактериальными и анальгезирующими средствами.

Так как в составе аэрозоля есть Лидокаин, то нежелательно совмещать его с бета-адреноблокаторами, барбитуратами, противосудорожными или антиаритмическими средствами, Новокаиномидом. Также анальгетик повышает эффективность снотворных и наркотических препаратов.