

Латинское название: Cholisal

Код АТХ: А01А D11, А01А П11

Действующее вещество: холина салицилат + цеталкония хлорид

Производитель: Jelfa (Польша), Valeant (РФ)

Отпуск из аптеки: безрецептурный

Условия хранения: при комнт. темп-ре, до 25°C

Срок годности: 3 г.

Стоматологический гель с противомикробным и противовоспалительным эффектом. Холисал снимает боль при заболеваниях десен, устраняет воспаление слизистых оболочек. Может использоваться для детей при прорезывании зубов, если процесс протекает с болезненными симптомами.

Показания к применению

Используется Холисал у детей при прорезывании зубов для облегчения процесса (устранения боли, подпухлостей, болезненности).

Помимо этого, применение геля показано при:

- Инфекционно-воспалительных патологиях рта
- Язвенных поражениях
- Трофических состояниях
- Поражении тканей рта зубными протезами
- Стоматите афтозном
- Состояниях после стоматологических оперативных вмешательств
- Радиационном дерматите после лучевой терапии
- Простом лишае.

Как одно из комплексных средств, гель может использоваться при многоформной экссудативной эритеме.

Состав препарата

Холисал гель

Содержание компонентов в 1 г:

- Действующие: салицилат холина (~ 87 мг), хлорид цеталкония (0,1 мг)
- Структурообразующие: Е 1525, метил- и пропилпарабен (Е 218, Е 216), глицерин, масло аниса, этиловый спирт (96 %).

Форма выпуска

Холисал гель – стоматологическое средство для обработки тканей рта снаружи или использования в десневых карманах. Разработана в форме просвечивающейся, не окрашенной гомогенной массы, пахнущей анисом. Средство упаковывается в тубы по 10-15 г. В коробке вместе с инструкцией – 1 емкость.

Холисал Дентал (гель)

- Состав: Е 1520, аprotинин, гипромеллоза, Е 216, Е 218, масло мяты перечной, трилон б, гидроокись натрия.

Мазь холисал – зубная паста с ароматом и вкусом мяты для ежедневного ухода за деснами и зубами. Выпускается в тубе с дозатором по 15 г и инструкцией.

Иные формы стоматологических средств (сироп, таблетки) не представлены.

Лечебные свойства

Терапевтическое действие препарата обеспечивается свойствами двух активных веществ. В результате Холисал оказывает сразу несколько действий: подавляет микробную инфекцию, устраняет или значительно снижает интенсивность воспалительных процессов, обезболивает.

- Холина салицилат обладает способностью оказывать местное обезболивающее и противовоспалительное действия. После нанесения на слизистые ткани всасывается внутрь, замедляет активность циклооксигеназы – ферментов, регулирующих синтезирование простагландинов и других соединений, участвующих в воспалительных процессах и болевом синдроме. Подавление ЦОГ способствует затуханию местных очагов воспаления и снятию боли. Помимо этого, салицилат холина подавляет функционирование макрофагов, нейтрофилов и пр.

веществ. Одновременно лекарственное вещество подавляет активность микробных и грибковых возбудителей, обитающих в кислой среде.

- Цеталкония хлорид – вещество с антисептическими свойствами. Подавляет микробную, грибковую и вирусную инфекцию. Отличается быстрым действием: его анальгезирующий эффект проявляется спустя пару минут после нанесения лекарства на участки воспаления и сохраняется на протяжении от 2 до 8 часов.

Благодаря комбинации нескольких действий, которые оказывают активные вещества, Холисал применяется в стоматологическом лечении для местной терапии.

Способ применения

Взрослые

Холисал для лечения десен и ротовой полости должен использоваться только местно. Если нет иных врачебных назначений, то при использовании Холисала нужно придерживаться инструкции по применению.

Согласно рекомендациям производителей, пользоваться стоматологическим гелем нужно от 2 до 3 раз в день. Процедуры можно проводить до либо после приема пищи, а также перед отходом ко сну.

Процедуру проводят чистыми руками: на палец нужно выдавить небольшой отрезок крема и осторожно нанести на больное место, после чего бережными массирующими движениями втереть.

При патологиях пародонта препарат закладывают в карманы десен и выдерживают в течение некоторого времени. Также гель можно наносить на десны в виде компрессов или смазывать им ткани.

Холисал для детей

Рекомендован при прорезывании зубиков малыша. Использовать только для нанесения на слизистые ткани.

Препаратом обрабатываются болезненные места от 2 до 3 р./д. Средством можно обезболить десны до приема еды, намазывать их после кормления, а также перед засыпанием. Техника использования для устранения детской патологии аналогична процедуре для взрослых: на палец выдавить небольшую полоску (около ½ см) и осторожно втереть в воспаленные ткани.

Холисал: с какого возраста ребенка можно пользоваться

ЛС рассчитан на малышей после годовалого возраста. Детям помладше средство также можно использовать, но после предварительной консультации у педиатра.

Особенности лечения

В стоматологическом геле содержатся компоненты, способные вызывать раздражение и аллергические реакции. Если в процессе использования возникли какие-либо нежелательные симптомы, то применение лекарства нужно отменить и обратиться к лечащему доктору.

При использовании средства для лечения нужно внимательно отнестись к покупке препарата, поскольку существует средство с похожим названием – Холисал Дента. Это зубная паста для ухода за полостью рта, которую можно использовать с 14-лет. Применяется для очищения поверхностей зубов и рта при ношении брекетов.

Холисал при беременности и грудном вскармливании

Специальных исследований на выявление продолжительности и объема проникновения веществ Холина в организм при местном использовании на слизистые ткани рта не проводилось. Особенности воздействия препарата на развитие плода пока неизвестны. Поэтому лечение Холином у беременных нежелательно, но может назначаться в некоторых случаях, когда есть сильная необходимость. Врач может разрешить на использование медикамента только в 1-2 тр. На поздних сроках применение салициловой кислоты и ее производных противопоказано.

Действующие вещества Холина обладают способностью проникать в женское молоко, а с ним – в организм младенцев. Использовать Холисал для грудничков запрещено. Поэтому кормящей женщине потребуется заменить гель на другое средство с доказанной безопасностью.

Поэтому от использования стоматологического геля во время лактации запрещено.

Противопоказания и меры предосторожности

Препараты Холисал запрещено использовать при:

- Индивидуальной непереносимости или высоком уровне чувствительности к компонентам геля или салицилатам

Относительные противопоказания, при которых применение нежелательно, но при необходимости возможно с соблюдением повышенных мер предосторожности:

- Беременность
- Период кормления грудью
- У детей до года.

Взаимодействие с лекарственными средствами

При местном использовании геля для десен Холисал в точном соответствии с назначением врача или рекомендациям инструкции в предложенных дозировках угроза взаимных реакций с иными медикаментами отсутствует.

Риск для здоровья и нежелательные взаимодействия могут случиться только после выраженной дозировки и возникновения системного эффекта от салицилатов. Тогда возможно развитие синергических реакций после приема иных противовоспалительных, болеутоляющих и жаропонижающих лекарств.

Если пациент помимо Холисал Дентал принимает лечение другими стоматологическими средствами, то ему нужно уточнить у доктора особенности нанесения. Возможно, что потребуется разнесение по времени проведение лечебных процедур.

Побочные эффекты

Обычно Холисал не вызывает никаких побочных явлений. Но у некоторых детей бывают ответные реакции в местах нанесения препарата, которые проявляются в виде жжения. Специального лечения не требуется, так как неприятное ощущение длится короткое время, и проходит самостоятельно.

Помимо этого, у особо чувствительных детей могут развиваться индивидуальные аллергические реакции на содержащиеся в препарате вещества.

Передозировка

Передозировка гелем для местного применения практически невозможна. Но если вдруг это произойдет, то пациенту нужно обильно прополоскать ротовую полость, и при необходимости – спровоцировать рвоту.

Если пациент отличается высоким уровнем чувствительности к АСК и салицилатам, то при передозировке гелем произойдет интенсивное всасывание салицилатов в организм. В таком случае могут возникнуть симптомы системного воздействия на организм: сильная потливость, шум/гул в ушах, тошнота, головокружение, рвота, высыпание на коже. При появлении этих явлений потребуется провести симптоматическую терапию.