Дентол беби

Латинское название: Dentol

Код АТХ: N01BA05

Активный компонент: бензокаин

Производитель: Фармасайнс, Канада

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен

Условия хранения: в сухом месте, где нет повышенной температуры и влажности

Срок годности: четыре года

Ведение в тему

Дентол беби предотвращает проведение нервных импульсов, благодаря чему обезболивается поверхность слизистых оболочек и кожных покровов. Поэтому препарат используется для ликвидации болевых ощущений у ребенка, у которого прорезываются зубы.

Гель применяется при непродолжительных стоматологических манипуляциях. Также его включает в комплексную терапию при афтозном стоматите.

Дентол беби оказывает обезболивающее действие через 60 секунд после использования. Однако анальгезирующий эффект сохраняется всего 20 минут.

Состав и форма выпуска

Форма выпуска препарата – гель. Светло-розовое вещество имеет однородную консистенцию и приятный фруктовый вкус.

В одном миллилитре средства содержится 75 или 100 мг бензокаина. Дополнительные составляющие:

1. Вода
2. Е 129
3. Е 211
4. Спирт
5. Е 200
6. Глицерин
7. Е 1520
8. Вишневый ароматизатор
9. Сахаринат натрия
10. Е 1521.

В одной тубе содержится 15 мг геля. Препарат помещен в картонную коробку вместе с инструкцией.

Фармакологические свойства

Бензокаин, считающийся главным компонентом геля – это антисептик местного действия. Вещество отвечает за блокировку проведения нервных импульсов, делая клеточные оболочки малопроницамемыми для ионов натрия. Такой процесс обеспечивает абсолютное обезболивание внутренних оболочек и кожи.

Дентол начинает действовать через минуту после его нанесения. Длительность эффекта – 20 минут.

После абсорбции лекарство быстро расщепляется холинестеразами плазмы печени и крови до метаболитов, в составе которых имеется витамин В 10. Дентол выводится из организма почками в качестве продуктов метаболизма.

Показания к применению

Гель, с концентрацией 7.5%, используют в случаях зубной боли у детей. Также Дентол помогает облегчить боль при прорезывании зубов у малышей, которым больше четырех месяцев. Еще препарат используется при болезни десен, для устранения признаков афтозного стоматита и скорейшего заживления слизистых оболочек рта, на которых есть ранки.

Дентол Беби с концентрацией 10% применяют для лечения заболевания зубов у детей возрастом от шести лет, и взрослых. Лекарство назначается для купирования болезненных ощущений в деснах, скорейшей регенерации поврежденных слизистых и лечения стоматологических болезней.

Инструкция по применению

Применение Дентола беби очень простое – вначале нужно хорошо помыть руки, затем открутить крышку и сделать отверстие в запаянном конце тубы. Из тюбика необходимо выдавить немного геля и нанести его на область, где прорезавыется зуб.

Для снятия зубной боли гелеобразным веществом смазывают десна, находящиеся рядом. Средство можно наносить до 4 раз в день без нежелательных последствий. Дентол не используют дольше одной недели.

Особенности применения

Стоматологи не рекомендуют использовать Дентол чаще и дольше, чем указано в инструкции. Также не стоит превышать дозировку. Если отечность, раздражение, краснота, высыпания и болевой синдром не проходят в течение семи суток, тогда необходимо незамедлительно обратиться к педиатру или дантисту.

Есть информация, что бензокаин иногда провоцирует метгемоглобинемию. Это состояние сопровождается рядом неприятных симптомов:

- Затрудненное дыхание
- Недомогание
- Головокружение

- Нарушение сердечного ритма
- Мигрень
- Цианоз ногтей, губ, кожный покровов.

При возникновении вышеописанных признаков, нужно прекратить применение геля и срочно обратиться за квалифицированной помощью в медучреждение.

Беременность и кормление грудью – относительные противопоказания к использованию Дентола. В этих случаях гель применяется только при крайней необходимости.

Лечение стоматологических проблем у детей, не достигших двухлетнего возраста, нужно проводить только под врачебным наблюдением.

Дентол беби не отражается на умственной деятельности, не ухудшает внимание и память ребенка.

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие

Противопоказания к назначению Дентола беби – непереносимость бензокаина и прочих антисептических веществ. Также применение геля запрещено при обширном поражении слизистой рта или инфекции в месте нанесения. Препарат не используется для лечения младенцев, которым нет 4 месяцев.

Дентол может вызывать следующие побочные реакции:

- Лихорадка
- Крапивница
- Отечность ротоглотки
- Жжение
- Гиперемия
- Высыпания
- Раздражение.

Передозировка Дентолом беби случается крайне редко. Лишь иногда препарат может оказать токсическое влияние на нервную, сердечную и сосудистую систему.

В результате у больного может развиться гипергидроз, ухудшение зрения, аритмия, сонливость, судорожные состояния, гипотония, приливы жара. Также возможно возникновение головокружения, тревожности, тиннитуси, покалывания в конечностях, спутанности сознания.

При передозировке необходимо промыть ротовую полость содовым раствором, а затем незамедлительно обратиться к доктору.

Взаимодействие Дентола беби с лекарствами:

1. Ингибиторы холинэстеразы – повышается эффект бензокаина
2. Сульфаниламиды – снижаются антибактериальные свойства антибиотиков

Обезболивающие антипиретики – увеличивается терапевтический эффект Дентола.