# Имудон: инструкция по применению иммуностимулятора

Латинское название: Imudon

Код АТХ: L03AX

Действующее вещество: Смесь лизатов бактерий

Производитель: Фармстандарт, Россия

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта

Условия хранения: t до 25 С

Срок годности: 36 мес.

Препарат являет собой иммуностимулятор, проявляет антигенные свойства. Благодаря применению Имудона удается устранить воспалительный процесс, активизировать работу иммунной системы, за счет этого повышается устойчивость организма к инфекциям.

## Показания к применению

Средство-иммуностимулятор применяется для предупреждения и лечения различных инфекционно-воспалительных недугов ротовой полости, а также глотки:

- Стоматит
- Развитие дисбактериоза ротовой полости
- Проявления фарингита
- Диагностирование гингивита (как язвенного, так и эритематозного)
- Пародонтоз или же пародонтит
- Появление язв, спровоцированных постоянным ношением зубных протезов
- Инфицирование слизистых рта после процедуры удаления зуба, а также вследствие имплантации зубов
- Подготовка пациента перед тонзилэктомией и послеоперационный уход
- Глоссит.

Стоит отметить, что препарат довольно эффективен при ларингите, помогает устранить проявления тонзиллита у взрослых и детей.

## Состав

Компоненты препарата подобраны таким образом, чтобы активизировать работу иммунной системы и сформироватья специфическую защиту организма от различных вирусов и бактерий. В состав ЛС (1 таб.) входит смесь лизатов полезных бактерий в сухом виде массовой долей 50 мг. Также в таблетках Имудон согласно описанию имеются:

- Стариновокислый Mg
- Кислота лимонная обезвоженная
- Лактоза
- Повидон

- Мертиолят, дезоксихолат и сахаринат Na
- Глицин
- Бикарбонат Na
- Кислота лимонная обезвоженная
- Мятный порошок
- Маннитол.

## Лечебные свойства

Не все знают, от чего помогает Имудон. Средство-иммуностимулятор бактериальной природы используется местно в стоматологической, а также оториноларингологической практике. Лекарство представлено поливалентным антигенным комплексом, включающих смесь бактериальных лизатов, которые схожи по структуре с микроорганизмами-возбудителями различных инфекционно-воспалительных недугов, локализующихся в области глотки и ротовой полости.

Действующие вещества Имудона способствуют активизации процесса фагоцитоза, повышают показатель в крови иммунокомпетентных клеток, при этом наблюдается производства лизоцима, а также иммуноглобулина А непосредственно в слюне.

Основным преимуществом лекарственного средства является местное воздействие; высокая эффективность при лечении вирусных, а также бактериальных патологий. Во время использования ЛС снижается потребность в антибиотикотерапии. Стоит отметить, что препарат может быть включен в любой вид лечебной терапии.

ЛС препятствует распространению патогенной флоры во рту, устраняет неприятный запах. Кроме этого, пилюли имеют ярко выраженный мятный вкус. Таблетки удобны в применении.

Имеется большой опыт использования лекарственного средства при лечении инфекционных патологий у детей и взрослых. Кроме проведения эффективной терапии при воспалительных недугах ротовой полости и глотки, лекарство успешно применяется для комплексного лечения герпетического стоматита у деток, различных изъязвлений слизистых рта. ЛС используется для предупреждения возникновения осложнений после проведения челюстно-лицевых операций.

## Форма выпуска

Белые пилюли с глянцевой поверхностью, округлые, помещены в блистер по 8 шт., внутри пачки имеется 5 блист.

Стоит отметить, что Имудон в форме спрея на данный момент не выпускается. Его часто путают с другим препаратом, который оказывает схожее действие, а именно ИРС 19. Применение лекарств может проходить по одинаковой схеме.

## Имудон: полная инструкция по применению

Назначается препарат детям подросткового возраста (с 14 лет), взрослым при диагностировании воспалительных патологий в ротовой полости, а также глотки в

суточной дозировке 8 таб. Пилюли необходимо рассасывать без предварительного разжевывания с временным интервалом 1-2 часа. Обычно лечебный курс длится около 10 дн.

С целью предупреждения рецидивов хронических воспалительных патологий глотки и ротовой полости следует применять по 6 таб. на протяжении дня, промежуток между приемом пилюль должен составлять 2 часа. Лечение обычно продолжается на протяжении 20 дн.

Имудон для детей в возрасте 3-14 лет при острых и хронических недугах горла и ротовой полости назначают по 6 таб. за сутки с промежутком 1-2 часа. Давать таблетки малышу и подростку необходимо в течение 10 дн. Способ применения препарата Имудон при ангине может отличаться. С профилактической целью пилюли должны приниматься 20 дн.

Проведение профилактических курсов показано 3-4 р. на протяжении года.

Имудон при беременности и при ГВ пить не следует, так как нет сведений о безопасности применения ЛС у этой группой плиц. Беременным и женщинам в период лактации (кормлении грудью) стоит пройти консультацию с врачом, специалист назначит эффективное лечение.

## Противопоказания и меры предосторожности

Не следует начинать иммуностимулирующее лечение препаратом Имудон при:

- Выявлении аутоиммунных недугов
- Развитии повышенной восприимчивости к компонентам.

Принимать Имудон не рекомендовано маленьким деткам (до 3 лет).

На протяжении часа после употребления пилюль не следует осуществлять прием пищи или же пить воду, таким образом, не снизится эффективность лекарства.

В случае назначения ЛС лицам, которые придерживаются бессолевого или же малосолевого питания, стоит обратить внимание на то, что в каждой таблетке имеется 15 мг Na.

При бронхиальной астме прием бактериальных лизатов может привести к обострению патологии, в связи с этим пить ЛС не следует.

Дети в возрастной группе от 3 до 6 лет должны принимать пилюли под контролем взрослых. При лечении изъязвлений потребуется постоянно контролировать состояние язв, при ухудшении состояния, стоит обратиться к врачу с целью подбора эффективного лечения.

Не сведений о влиянии ЛС на способность управления автотранспортом и на работу с точными механизмами.

## Перекрестные лекарственные взаимодействия

На данный момент нет информации о возможном взаимодействии Имудона с другими медикаментами. При необходимости допускается одновременный прием лекарств, но только после консультации с врачом.

В некоторых случаях возможно проведение комбинированного лечения с применением гомеопатических средств. Подбор эффективного фитопрепарата для лечения инфекционно-воспалительного процесса осуществляется строго индивидуально с учетом типа патологий и общего состояния пациента.

## Побочные эффекты

Зачастую препарат хорошо переносится, но не стоит исключать возникновение негативных проявлений. Во время применения иммуностимулятора могут наблюдаться различные побочные реакции:

- Проявления аллергии: отек Квинке, высыпания на кожном покрове
- ЖКТ: довольно редко отмечается тошнота, эпигастральные боли
- Дыхательная система: развитие кашлевого синдрома, частые приступы бронхиальной астмы
- Система свертывания крови: довольно редко наблюдается развитие геморрагического васкулита, могут регистрироваться признаки тробоцитопении
- Реакции со стороны кожи: возникновение эритемы узловатого типа
- Иные: изменение температуры тела.

При проявлении каких-либо негативных реакций следует сообщить врачу. Возможно, потребуется заменить препарат.

## Передозировка

Не отмечалось развитие передозировки в случае употребление сверхдоз лекарственного средства. Хотя вероятность развития негативной симптоматики при ненамеренном приеме высоких дозировок Имудона минимальна, не следует отступать от схемы лечения, назначенной врачом.