

Драмина

Латинское название: Dramina

Код АТХ: R06AX

Действующее вещество: Дименгидринат

Производитель: Ядран, Хорватия

Условие отпуска из аптеки: без рецепта

Условия хранения: в затемненном месте, где нет влаги

Срок годности: пять лет

Препарат Драмина – таблетки, купирующие тошноту, рвоту и вертиго, возникающие при дисфункции вестибулярной системы. Зачастую средство пьют перед путешествием на транспорте, чтобы предупредить укачивание.

Состав и форма выпуска

Форма выпуска и состав препарата не отличаются от других средств. Инструкция по применению гласит, что Драмина – это таблетки. Главный компонент средства – дименгидринат (50 мг).

Таблетки Драмина имеют следующие дополнительные компоненты:

1. Кросповидон
2. Молочный сахар
3. Повидон
4. Е 572
5. ЦМК.

Светлые таблетки отличаются круглой формой. На каждой пилюле имеется риска и фаска.

Таблетки Драмина от укачивания в транспорте находятся в блистере по 5-10 штук. Контурная упаковка и аннотация помещены в пачку из картона.

Фармакологические свойства

Инструкция по использованию Драмины гласит, что средство обладает противошоковыми свойствами. Таблетки обладают свойствами холиноблокаторов и блокаторов рецепторов гистамина (H1).

Лекарство Драмина ингибирует выработку ацетилхолина и предупреждает его проникновение в везикулы. Помимо вышеописанных эффектов, действие Драмины направлено на подавление вестибулярной стимуляции.

Большая концентрация дименгидрината влияет на полукружные каналы костного лабиринта в ухе, благодаря которым человек может держать равновесие и ориентироваться в пространстве.

Так, инструкция гласит, что таблетки Драмина надо принимать, когда укачало, чтобы избавиться от рвоты, вертиго, тошноты и улучшить функционирование вестибулярного аппарата.

Еще Драмина отличается успокоительным, противоаллергенным и маловыраженным анестезирующим местным действием. После внутреннего приема происходит быстрая резорбция дименгидрината из ЖКТ.

Противорвотный эффект ощущается через 15 минут после применения лекарства. Действие продолжается до 6 часов.

Драмина равномерно рассредоточивается по всем тканям. Активные компоненты средства хорошо взаимодействуют с белками плазмы.

Дименгидринат в большой дозировке преодолевает плацентарный барьер. Его выведение осуществляется почками. Компоненты проникают в грудное молоко.

При долгом приеме лекарства может появиться толерантность к базовому компоненту. Это способствует уменьшению противорвотного и успокаивающего действия.

Показания к применению

Применение препарата Драмина показано при синдроме укачивания, возникшем на фоне длительной поездки в любом транспорте. Таблетки назначаются для купирования признаков вестибулярных расстройств и признаков чрезмерной стимуляции внутреннего уха.

К неприятным проявлениям заболевания движения относят рвоту, тошноту и вертиго. Как принимать Драмину перед поездкой, чтобы предупредить развитие кинетоза, написано в инструкции, прилагаемой к таблеткам.

Другие показания к приему лекарства – поражение лабиринта, сопровождающиеся вертиго, тугоухостью, звоном в ушах. Также таблетки используют для ликвидации вестибулярной дисфункции при травмах мозга.

Инструкция по применению

В инструкции по применению препарата Драмина написано, что пилюли пьют перед приемом пищи. Рекомендуется запивать пилюли водой.

Способ применения лекарства Драмина:

1. Кинетоз – до 2 пилюли до 3 раз в день
2. Вестибулярные расстройства – 1-2 таблетки 2 раза в сутки
3. Заболевания лабиринта – до 2 пилюлей 2-3 раза в день.

В инструкции к препарату Драмина также написано, как принимать лекарство детям. При болезни движения, вестибулярной дисфункции в возрасте 3-6 лет дозировка составляет $\frac{1}{4}$ либо 0.5 таблетки до 3 раз в день. Детям от 7-12 лет показано по 0.5-1 пилюле 2-3 раза в день.

Драмина для детей 3-12 лет при болезнях лабиринта принимается по $\frac{1}{2}$ -1 пилюле до 3 раз в день.

Наибольшая количество в сутки для взрослого человека – 7 таблеток. В профилактических целях, чтобы предупредить развитие кинетозов, пьют по 1-2 пилюли за 30 минут до поездки. Время приема устанавливает доктор.

В пожилом возрасте начальную дозировку уменьшают до 25 мг. При заболеваниях печени количество препарата снижают вдвое (12.5 мг).

При беременности Драмина не применяется, особенно в 1 триместре. С 6-9 месяцев использование препарата возможно в исключительных ситуациях, но только под врачебным наблюдением

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие

Прием Драмины противопоказан при, лактации, эпилепсии, непереносимости компонентов, острых дерматозах. С осторожностью таблетки принимают при судорогах, гиперфункции щитовидки, зрительных расстройствах, рубцово-язвенном стенозе, гиперплазии простаты. Также не желательно использование средства при непроходимости шейки мочевого пузыря, нарушении сердечно-сосудистой деятельности и бронхиальной астме.

Всем принимающим Драмину важно знать, как принимать ее правильно. В противном случае возможно развитие ряда побочных реакций:

- Дыхательные органы – пересыхание слизистой носа, выделение густой жидкости из бронхов
- Сердце и сосуды – гипотония, тахикардия
- Пищеварительные органы – отсутствие аппетита, рвота, ксеростомия, тошнота
- Нервная система – зрительные нарушения, ухудшение внимания, мигрень, вестибулярные расстройства, бессонница, недомогание, тревога, сонливость, вертиго
- Иммунная система – отечность, бронхоспазм, кожная сыпь.

Также дименгидринат может поспособствовать развитию анемии и затруднению мочеиспускания.

Передозировка препаратом Драмина проявляется покраснением лица, пересыханием носоглотки. Еще возможно угнетение ЦНС, возникновение гипотонии, сонливости, судорог. Иногда может нарушиться дыхательная, слуховая или зрительная деятельность и появиться дерматоз, дискомфорт в ЖКТ.

В случае надобности проводится лечение, направленное на ликвидацию негативных признаков. Терапия может заключаться в очищении желудка, использовании сорбентов и таблеток, повышающих АД.

Лекарственное взаимодействие Драмины:

1. Повышается эффективность нейролептиков, успокоительных, антидепрессантов, снотворных, катехоломинов, барбитуратов
2. Увеличивается вероятность появления зрительных расстройств при приеме с психотропными препаратами, Скополамином, обезболивающими и препаратами висмута

3. При применении с антибиотиками нивелируется ототоксическое влияние противомикробных средств, также возможно появление необратимых нарушений в работе слухового аппарата.
4. Ослабляется действие глюкокортикостероидов и антикоагулянтов.

Сочетание Драмина и алкоголя приводит к усилению токсического воздействия спиртного на организм. Поэтому таблетки запрещено принимать вместе со спиртным.