

Латинское название: Florin forte

Код АТХ: А07F А

Действующие вещества: бифидо- и лактобактерии

Производитель: Партнер (РФ)

Отпуск из аптеки: без рецепта

Условия хранения: при т-ре ниже 10 °С

Срок годности: 18 мес., (при 25 °С – максимум 10 сут.)

Флорин Форте – пробиотик в капсулах и порошке для поддержания или восстановления нормального уровня микрофлоры кишечника, пострадавшей после инфекционных заболеваний различного происхождения. Содержит комплекс бифидо- и лактобактерий, которые после прохождения в ЖКТ восстанавливают необходимую популяцию полезных бактерий и тем самым способствуют нормальному пищеварению, усилению иммунитета, улучшению общего самочувствия.

Показания к применению

Флорин Форте рекомендован при:

- Терапии заболеваний с сопутствующим расстройством кишечной микрофлоры вследствие образовавшегося дефицита бифидо-, лактобактерий или эндогенных кишечных палочек
- Лечении острых форм инфекций кишечника, спровоцированных ротавирусным либо условно патогенным возбудителем
- Восстановлении нормального уровня микрофлоры кишечника
- Терапии кишечных острых патологий невыясненного происхождения
- Хронических формах кишечных болезней (вкл. вызванных гемолизирующей кишечной палочкой).

Состав медпрепарата

Пробиотик производится в виде порошка для перорального приема и капсул.

Порошок

Содержание компонентов в 1 саше:

- Активный: ~50 млн. колониеобразующих бифидобактерий (сорбированные акт. углем), ~50 млн. лактобактерий
- Дополнительные: моногидрат лактозы.

ЛС в форме бледно- или темно-серого порошка с еле уловимым специфическим кисломолочным ароматом. В структуре препарата могут быть темные или черные включения. Препарат расфасован в саше, изготовленные из нескольких слоев металлополимера. В коробке с инструкцией – 10, 20 либо 30 саше вместе с сопроводительной аннотацией.

Капсулы

Содержание веществ в 1 шт.:

- Активные: по ~ 50 млн лактобактерий и бифидобактерий, сорбированных акт. углем
- Наполнение: желатин, сахароза (компоненты высушивающей среды), активир. уголь, Е 572, лактоза (в форме моногидрата)
- Оболочка: корпус – Е 171, желатин; крышечка – Е 171, окись железа, желатин.

ЛС в виде жестких желатиновых капсул с белым корпусом и желтой крышечкой. Наполнение – бледно- или темно-серая порошковая смесь с возможными черными включениями, издающая кисломолочный запах. Капсулы расфасованы в блистеры по 10 штук либо по 30 шт. в полимерные банки. В коробке из медицинского картона – 1 или 2 пластинки (либо 1 емкость) сопроводительное руководство.

Лечебные свойства

Терапевтическое действие Флорина Форте обеспечивается его главными компонентами – бифидо- и лактобациллами. После приема медикамента восстанавливается нормальный уровень полезных бактерий в ЖКТ, подавляется активность и сокращается популяция патогенных микроорганизмов, провоцирующих заболевания в органах ЖКТ.

Совместное направленное действие двух видов бактерий способствует ускоренному восстановлению качественной и количественной популяции эндогенных организмов, улучшению метаболических процессов с их участием и более активному функционированию.

Одновременно происходит усиление подавления деятельности болезнетворных возбудителей инфекционно-воспалительных патологий ЖКТ, нейтрализация патогенов, провоцирующих острые формы респираторных заболеваний и более быстрое их выведение из организма. Помимо этого, в ходе применения пробиотика повышается иммунитет и усиливается стойкость организма к внешним негативным воздействиям.

Бифидобактерии

Бактерии, присутствующие в пробиотике, оказывают антимикробное действие, благодаря своему антагонизму к патогенным и потенциально патогенным микроорганизмам. Кроме того, обладает свойствами иммуномодулятора, поскольку активизируют синтезирование иммуноглобулинов, белковых соединений с противовирусной активностью (интерферонов), циткиинов.

Биофлора поддерживает местный иммунитет, убыстряет восстановление и функционирование клеток слизистых тканей органов пищеварения, продуцирует короткоцепочечные ЖК, ферменты, молочную кислоту.

При этом бифидобактерии выполняют функцию сорбента, поскольку подавляют и депонируют токсичные вещества, а затем выводят наружу.

Лактобактерии

После попадания внутрь организма подавляют увеличение популяции патогенов через механизм синтезирования молочной кислоты, белкового обмена, образование пероксида водорода, желчных и нуклеиновых кислот.

Биофлора способствует росту иммунитета, предупреждает формирование осложненных форм кишечных болезней за счет укрепления защитных сил и их активизации.

Лактобациллы уменьшают вред от окислительных процессов, обезвреживают свободнорадикальные соединения.

Бифидо- и лактобактерии, действуя совместно, более сильно угнетают ротавирусную инфекцию и гемолизирующую кишечную палочку, способствуют выработке бактериоцинов (веществ с действиями подобными антибиотикам), участвуют в образовании витаминов.

Помимо полезных микроорганизмов, в препарате присутствует лактоза. Вещество включено в состав медикамента для обеспечения жизнедеятельности бифидо- и лактобацилл.

Особенности фармакокинетики

Препарат отличается высокой степенью безопасности, поскольку практически не проходит в систему кровообращения и не вызывает негативной реакции организма.

Способ применения

Флорин Форте может назначаться пациентам с первых часов рождения (вкл. недоношенным младенцам). Препарат принимают вне зависимости от приема еды. Капсулы рекомендуется запивать водой, содержимое пакетиков – смешивать с напитками или едой. Маленьким детям порошок можно соединять с грудным молоком либо детским питанием.

Капсулы

Дозировки, рекомендуемые инструкцией по применению:

Дети

- 0-6 мес.: по содержимому 1 капсулы 2 р./д.
- От 6 мес. до 3 л.: по 1 капс. (содержимое) 3 р./сут.
- С 3 лет: по 1 капс. 3-4 р./сут.

Взрослые

- По 2 капс. 3 р./сут.

Если пациент в силу возраста или проблем с глотанием не способен принять капсулу, то ее содержимое извлекают, соединяют с жидкой пищей (лучше всего кисломолочным продуктом) или прокипяченной водой, остуженной до комнатной температуры. Полученную кашцеобразную смесь с темными включениями принимают сразу, не ожидая растворения черных частичек.

Порошок

Дети

- 0-6 мес.: по 1 пак. 2 р./д.
- 6 мес.-3 года: 1 пак. 3 р./д.
- С 3 лет: 1 пак. 3 р./д.

Взрослые

- По 2 пак. 3 р./сут.

Продолжительность курса зависит от диагноза и выраженности патологии:

- Заболевания с сопутствующими расстройствами кишечной микрофлоры – от 10 до 15 сут.
- Острые инфекции кишечника – от 5 до 7 сут.
- Острые формы патологий органов дыхания – 5-10 сут.
- Восстановление организма после тяжелых патологий – 10-15 сут.
- Устранение дисбактериозов – 10-15 сут.

При беременности и ГВ

Флорин Форте может использоваться в терапии беременных и кормящих женщин.

Противопоказания

Флорин Форте запрещено применять при наличии у пациента:

- Индивидуальной сверхчувствительности организма
- Врожденном дефиците лактазы, нарушении усвоения галактозы, глюкозы.

Меры предосторожности

Никаких специфических условий приема не существует.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Если Флорин Форте используется совместно с иными медсредствами, то нужно учитывать:

- Витаминотерапия усиливает действие бифидо- и лактобацилл.

- Если пробиотик сочетается с лечением антибиотиками, то препараты нужно принимать с интервалом не меньше 3-4 часов.

Побочные эффекты

Флорин Форте переносится хорошо практически всеми пациентами. Побочных эффектов не зарегистрировано.

Передозировка

Прием высоких дозировок не вызывает негативных последствий. Теоретически возможно развитие усиленной индивидуальной реакции организма.