

Инструкция по применению препарата нимесулид

Латинское название: nimesulid

Код АТХ: M01AX17

Действующее вещество: нимесулид

Производитель (название компании и страна): Тева Фармацевтикал Индастрис, Израиль

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от детей

Срок хранения: 3 года.

Нимесулид – нестероидное противовоспалительное средство умеренного действия.

Показания по применению

Средство назначается преимущественно с целью лечения болей при поражении опорно-двигательного аппарата. К ним относятся:

- остеоартроз
- артрит ревматоидный
- воспаление суставов
- бурсит
- тендинит, воспаление связочного аппарата
- артрозы.

Также можно принимать данный НПВС при болезненных менструациях, зубных болях, мигрени и головной боли напряжения, в период после перенесенных хирургических вмешательств. На причину возникшей болезни, вызвавшей воспаление, лекарство не оказывает влияния.

Состав препарата

Таблетки нимесулид состоят со 100 мг активного действующего вещества.

Вспомогательные компоненты – наполнители, стабилизаторы, желтый пищевой краситель.

Лечебные свойства

Препарат относится к группе нестероидных противовоспалительных средств избирательного действия. У препарата имеются умеренные обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие фармакологические свойства. Также препарат влияет на реологию крови, слегка разжижая ее. Механизм действия заключается в торможении выделения простагландинов, а также избирательным подавлении ЦОГ-2. Это снижает риск получения побочных эффектов на ЖКТ, при пероральном применении.

Формы выпуска

Под конкретным торговым названием продается только таблетированная форма выпуска. Ампулы для инъекций и свечи ректальные продаются под другими торговыми названиями, как и гель для наружного использования.

Способ применения и дозы

Инструкция по применению таблеток нимесулид указывает, что препарат принимается перорально, сразу после еды. Разовая дозировка составляет 50 – 100 мг. Можно пить 2 раза в сутки. Если имеются почечные патологии в анамнезе, то следует ограничиться однократным приёмом, и не более 100 мг. Длительность лечения не должна превышать 2 недели. Чем короче курс терапии, тем меньше риск возникновения побочных эффектов.

При беременности и грудном вскармливании

Беременным и кормящим матерям не рекомендуется использовать лекарственное средство без веских причин.

Противопоказания и меры предосторожности

Средство нельзя назначать в таких случаях:

- эрозии или язвы желудка, двенадцатиперстной кишки
- бронхиальная астма в анамнезе
- индивидуальная непереносимость НПВС
- аллергия на ацетилсалициловую кислоту
- наличие внутренних кровотечений
- язвенный колит в анамнезе
- воспалительные процессы в кишечнике или болезнь Крона
- гемофилия
- проблемы с нормальной свертываемостью крови
- внутренние кровотечения в желудке
- почечная недостаточность или нарушение функциональности мочевыделительной системы
- гепатит в анамнезе
- ХСН в стадии декомпенсации
- повышенное содержание калия в крови
- беременность и грудное вскармливание
- несовершеннолетний возраст до 12 лет
- одновременное использование гепатотоксических медикаментов.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Средство плохо влияет на показатели печени при одновременном использовании прочих гепатотоксических средств. Снижает эффекты мочегонных средств и при этом потенцирует эффективность антикоагулянтов. При одновременном использовании СИОЗС и системных глюкокортикостероидов возникает риск перфорации стенок кишечника. Также происходит усиление нефротоксических эффектов циклоспорина.

Побочные эффекты

У препарата имеется достаточный перечень возможных последствий для организма.

Со стороны ЦНС наблюдаются: синдром Рейе, головные боли, ночные кошмары, повышенная тревожность, страхи, нервные потрясения и сильное головокружение.

Кожа и слизистые оболочки: зуд, гипергидроз, покраснение, крапивница, дерматит, отеки, сыпь на теле, некротические образования, эритема.

Мочевыделительный тракт: почечная недостаточность, кровь в моче, задержка выделения мочи и отечность.

ЖКТ: застой желчи, гастрит с повышенной кислотностью, вздутие живота, запоры, рост биохимических показателей крови (АЛТ, АСТ), перфорация или образование прободной язвы, повышение билирубина, гепатит, желтуха, боли в желудке.

Система кроветворения: геморрагия, анемия, тромбоцитопения, усиленная кровоточивость.

Дыхательные органы: одышка, бронхоспазм, обострение бронхиальной астмы до астматического статуса.

Прочее: приливы, нарушение четкости зрения, аллергические реакции, снижение температуры тела, повышение калия в крови, слабое состояние, тахикардия и гипотония.

Передозировка

Передозировка нимесулида проявляется зачастую тошнотой, рвотой или избыточной сонливостью. При длительном использовании наблюдаются кровотечения из ЖКТ, повышение давления, снижение работоспособности и нарушения со стороны дыхательной системы. Требуется симптоматическая терапия, заключающаяся в промывании желудка и употреблении энтеросорбентов.