Инструкция по применению препарата адвил

Латинское название: advil
Код АТХ: M01AE01
Действующее вещество: ибупрофен
Производитель (название компании и страна): Лозан Фарма, Германия
Условия отпуска: рецепт не требуется
Условия хранения: в сухих условиях и при комнатной температуре, подальше от детей
Срок хранения: 3 года.

Применение адвила показано при воспалительных состояниях.

Показания по применению

В зависимости от вида заболеваний, лекарство назначается:

- Воспаления суставного аппарата: артрит ревматоидный или подагрический, остеоартрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, спондилёз
- Заболеваниях хребта, мышечные патологии – люмбаго, ишиас, миалгия, бурсит, тендинит, растяжки и травмы связок, сухожилий, послеоперационный период
- Зубная боль, головная боль напряжения, мигрень
- Высокая температура при ОРЗ, ОРВИ, гриппе и простуде.

Дополнительно помогает для снятия воспаления при фарингите, ларингите, воспалениях ЛОР-органов верхних и нижних дыхательных путей, пневмонии. Можно использовать при гинекологических заболеваниях, включая болезненные менструации, а также при аднексите. При нефротическом синдроме лекарство способно снизить количество выделяемого белка с мочой.

Состав препарата

Таблетки адвил содержат 400 мг действующего вещества. Также есть капсулы в такой же дозировке. Вспомогательные компоненты зависят от конкретной формы выпуска. Часто ими являются наполнители и стабилизаторы.

Лечебные свойства

Препарат обладает обезболивающими, антипиретическими и противовоспалительными фармакологическими свойствами. Ибупрофен в составе – классический НПВС, обладающий неизбирательными свойствами блокировать ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Данные ферментные вещества принимают участие в обменных процессах арихидоновой кислоты, которая является предшествующим элементом перед возникновением простагландином, медиаторов воспаления и боли. Механизм действия заключается в подавлении активности данных веществ. Средство способствует разжижению крови, за счет подавления агрегации тромбоцитов.

Ибупрофен лучше снижает высокую температуру у детей, если парацетамол не помогает. Средство полностью усваивается при пероральном употреблении. Если пить во время еды, то скорость усвоения несколько снизится. Перерабатывается средство в печени. Период

полувыведения составляет 2-3 часа в среднем. Примерно две трети принятой дозировки выводится вместе с мочой, практически одна треть – вместе с каловыми массами. Остальное – в непереработанном виде.

Формы выпуска

В продаже можно найти драже для рассасывания по 200 мг, шипучие таблетки по 400 мг в одной штуке, обычные таблетки по 400 мг, капсулы по 400 мг. Детская форма выпуска – пероральная суспензия во флаконах по 200 мл.

Способ применения и дозы

Инструкция по применению адвила указывает, что лекарство принимается перорально. У препарата режим использования дозировок индивидуален, устанавливается лечащим врачом. Обычно разовая доза лекарства у взрослых составляет 200 – 800 мг, принимаемые 3 раза в день. У детей дозировка подбирается из расчёта 20 – 40 мг на килограмм веса тела, разделенная на несколько приёмов. Максимальная суточная дозировка у взрослых не должнв превышать 2.4 грамма.

При беременности и грудном вскармливании

Беременным и кормящим матерям не рекомендуется назначать данное лекарственное средство в любой форме выпуска. Назначение возможно в исключительных ситуациях и под наблюдением лечащего врача.

Противопоказания и меры предосторожности

Препарат нельзя назначать в таких ситуациях:

- Язвы и эрозии желудочно-кишечного тракта
- Индивидуальная непереносимость или гиперчувствительность к лекарственному средству, любым его компонентам
- Проблемы со свертываемостью крови, лейкопения, тромбоцитопения
- Геморрагический диатез в анамнезе
- Наличие непереносимости ацетилсалициловой кислоты
- Аллергические проявления – насморк, крапивница, возникающие на фоне употребления НПВС
- Проблемы со зрением, нарушение цветовосприятия, дефекты зрительного нерва
- Избыток калия в организме
- Почечная недостаточность
- Проблемы с почками в анамнезе
- Выраженная сердечная недостаточность
- Детский возраст до 6 лет (в случае применения твердых пероральных форм).

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Колестирамин снижает количество усвояемого ибупрофена. Аспирин снижает концентрацию средства в плазме крови. Синтетические глюкокортикоиды способствуют появлению побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. При

комбинации с варфарином возникает риск появления сильных кровотечений. Баклофен способствует усилению побочных эффектов лекарства. Диуретики, каптоприл и бета-блокаторы немного хуже действуют при одновременной комбинации с НПВС. Метотрексат и литий активнее накапливаются в организме. Лекарство ухудшает усвоение гипогликемические средства, непрямые антикоагулянты и фенитоин.

Побочные эффекты

Со стороны ЖКТ: рвота, тошнота, плохой аппетит, боли в животе, язвы и эрозии на стенках желудка, сухость во рту, афтозный стоматит, понос, запор и вздутие живота.

Со стороны ЦНС: головные боли, нервозность, рассеянность, спутанность сознания, галлюцинации, психомоторное перевозбуждение, проблемы со слухом, раздвоение картины видения, отечность век.

Сердце и сосуды: одышка, повышение давления и ускоренное сердцебиение, возможен бронхоспазм.

Показатели ОАК: повышение эозинофилов, снижение гемоглобина, лейкопения, агранулоцитоз.

Метаболические нарушения: отечность, раздражение мочевого пузыря, проблемы с почками, полиурия.

Иммунитет: сыпь на теле, крапивница, зуд, отек Квинке, аллергический насморк, анафилактический шок, эпидермальный токсический некролиз.

Передозировка

Передозировка проявляется усиленной головной болью, расстройством стула, проблемами с сердечно-сосудистой системой, болями в желудке. Лечение симптоматическое, с промыванием желудка и приемом энтеросорбентов.